

# Ascopan

## Comprimidos de Butilbrometo de Hioscina 10 mg

**Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento, pois contém informação importante para si.**

- Guarde este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Esse remédio foi receitado para você. Não o passe para os outros. Pode prejudicá-los, mesmo que seus sintomas sejam os mesmos que os seus.
- Se algum dos efeitos secundários se tornar incómodo ou grave, ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

### O que tem neste folheto:

1. O que é os Ascopan Comprimidos e para que é utilizados
2. O que precisa saber antes de tomar Ascopan Comprimidos
3. Como tomar Ascopan Comprimidos
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como conservar Ascopan Comprimidos
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

### 1. O que é os Ascopan Comprimidos e para que é utilizados

Os Ascopan Comprimidos contêm um medicamento chamado "Butilbrometo de Hioscina". Este pertence a um grupo de medicamentos chamados "antiespasmódicos".

Os Ascopan Comprimidos são usados para aliviar câibras nos músculos do seu:

- Estômago
- Intestino (intestino)
- Bexiga e os tubos que levam para fora do seu corpo (sistema urinário)

Também pode ser usado para aliviar os sintomas da síndrome do intestino irritável (SII).

### 2. O que precisa saber antes de tomar Ascopan Comprimidos

- Tem alergia (hipersensibilidade) ao butilbrometo de hioscina ou a qualquer outro componente (indicados na secção 6)
- Você tem glaucoma (um problema ocular)
- Você tem algo chamado 'miastenia gravis' (um problema de fraqueza muscular muito raro)
- Você tem um bloqueio intestinal suspeito ou confirmado
- Você tem uma condição em que o intestino está bloqueado e não funciona adequadamente (íleo paralítico ou obstrutivo). Os sintomas incluem dor abdominal intensa com falta de fezes e/ou náuseas/vômitos
- Você tem um intestino muito dilatado (megacólon)
- Você está grávida, com probabilidade

de engravidar ou está amamentando. Não tome este medicamento se alguma das situações acima se aplicar a si. Se tiver dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

### Tome especial cuidado com Ascopan Comprimidos

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar o medicamento se:

- Você tem uma frequência cardíaca muito rápida ou outros problemas cardíacos
- Você tem um problema com sua glândula tireoide, como uma glândula tireoide hiperativa
- Você tem dificuldade ou dor ao urinar, como em homens com problemas de próstata
- Você tem constipação
- Você tem febre

Se não tiver a certeza se alguma das situações acima se aplica a si, fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Ascopan Comprimidos.

Fale com o seu médico ou farmacêutico imediatamente se tiver dor abdominal inexplicável que persiste ou piora ou ocorre com:

- febre
- sentindo doente
- estar doente
- alterações nos movimentos intestinais
- sensibilidade abdominal
- pressão sanguínea baixa
- sensação de desmaio ou,
- sangue nos movimentos intestinais

### Tomar outros medicamentos

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos. Isso inclui medicamentos obtidos sem receita médica e medicamentos fitoterápicos. Isso ocorre porque os Ascopan Comprimidos podem afetar a forma como alguns outros medicamentos funcionam. Além disso, alguns outros medicamentos podem afetar a forma como os Ascopan Comprimidos funcionam.

Em particular, informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar algum dos seguintes:

- Medicamentos para a depressão chamados "antidepressivos tetracíclicos" ou "antidepressivos tricíclicos", como a doxepina
- Medicamentos para alergias e enjoos de viagem chamados "anti-histamínicos"
- Medicamentos para controlar os batimentos cardíacos, como quinidina ou disopiramide
- Medicamentos para doença mental grave chamados "antipsicóticos", como haloperidol ou flufenazina
- Medicamentos geralmente usados para problemas respiratórios, como tiotrópio, ipratrópio ou medicamentos semelhantes à atropina
- Amantadina - para doença de Parkinson e gripe

- Metoclopramida - para sentir-se enjoado (náuseas)

Se não tiver a certeza se alguma das situações acima se aplica a si, fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Ascopan Comprimidos.

### Gravidez e amamentação

Não tome Ascopan Comprimidos se estiver grávida, com probabilidade de engravidar ou amamentando.

Condução e utilização de máquinas  
Algumas pessoas podem ter problemas de visão enquanto tomam este medicamento. Se isso acontecer com você, espere até que sua visão volte ao normal antes de dirigir ou usar qualquer ferramenta ou máquina.

Informações importantes sobre alguns Componentes de Ascopan Comprimidos  
Os Ascopan Comprimidos contêm sacarose. Fale com o seu médico antes de tomar este medicamento se lhe disserem que não pode tolerar ou digerir alguns açúcares.

### 3. Como tomar Ascopan Comprimidos

Tome sempre o seu medicamento exatamente como o seu médico ou farmacêutico lhe indicou. Deve consultar o seu médico ou farmacêutico se não tiver a certeza. Os Ascopan Comprimidos não devem ser tomados continuamente por longos períodos de tempo.

### Tomar este medicamento

- Tome seus comprimidos com água
- Não quebre, esmague ou mastigue os comprimidos

### Quanto levar

Adultos e crianças acima de 12 anos

- A dose habitual é de dois comprimidos 4 vezes ao dia
- Para a Síndrome do Intestino Irritável, o seu médico pode dar-lhe uma dose inicial mais baixa de um comprimido 3 vezes ao dia. Esta dose pode ser aumentada, se for necessário um alívio adicional

### Crianças de 6 a 12 anos:

- A dose habitual é de um comprimido 3 vezes ao dia

Os Ascopan Comprimidos não são recomendados para crianças menores de 6 anos.

### Se tomar mais Ascopan Comprimidos do que deveria

Se tomar mais Ascopan Comprimidos do que deveria, fale com um médico ou dirija-se imediatamente a um hospital. Leve a embalagem do medicamento consigo mesmo que não restem Ascopan Comprimidos .

### Caso se tenha esquecido de tomar Ascopan Comprimidos

- Se se esquecer de uma dose, tome-a assim que se lembrar. No entanto, se for hora da próxima dose, pule a dose esquecida.
- Não tome uma dose dupla para compensar uma dose esquecida.

### 4. Possíveis efeitos colaterais

Como todos os medicamentos, Ascopan Comprimidos pode causar efeitos colaterais, embora nem todos os

apresentem. Os seguintes efeitos secundários podem ocorrer com este medicamento.

**Pare de tomar o seu medicamento e consulte um médico imediatamente se notar algum dos seguintes efeitos secundários graves - pode necessitar de tratamento médico urgente:**

- Reações alérgicas, como reações cutâneas, por exemplo. erupção cutânea com urtiga, comichão (afeta menos de 1 em 100 pessoas), erupção cutânea, vermelhidão da pele
- Reações alérgicas graves (choque anafilático), como dificuldade em respirar, sensação de desmaio ou tontura (choque)
- Olho vermelho doloroso com perda de visão

### Outros efeitos colaterais

- Boca seca (afeta menos de 1 em 100 pessoas)
- Sudorese anormal ou sudorese reduzida (afeta menos de 1 em 100 pessoas)
- Aumento da frequência cardíaca (afeta menos de 1 em 100 pessoas)
- Ser incapaz de passar água (urina) (afeta menos de 1 em 1.000 pessoas)

### Relato de efeitos colaterais

Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos colaterais não listados neste folheto.

### 5. Como conservar Ascopan comprimidos

Armazenar em local seco abaixo de 25°C. Proteger da luz.

- Não tome este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem
- Manter fora da vista e do alcance das crianças.

### 6. Conteúdo da embalagem outras informações

#### Qual a composição de Ascopan Comprimidos

- A substância ativa é Butilbrometo de Hioscina.
- Cada Comprimido revestido contém 10 mg de Butilbrometo de Hioscina.
- Os outros componentes são: Lactose, Amido Glicolato de Sódio, Pó de Celulose Microcristalina, PVPK-30, Benzoato de Sódio, Talco Purificado, Estearato de Magnésio, Sílica Coloidal Anidra (Aerosil), Kyron T-314, Avicel-102, Dicloreto de Metileno.

Ascopan Comprimidos estão disponíveis em caixinha de 2 x 10 Comprimidos.

Este folheto foi revisto pela última vez em Dezembro de 2022.

MA Holder:



MS Lab  
92 rue de Lévis  
75017 PARIS FRANCE  
www.mslabfrance.com

[Click Here to Know More](#)