

Albendazol

Albendazol Suspensão Oral 200 mg/5 ml

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informação importante para si.

- Conserve este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, pergunte ao seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi prescrito apenas para você. Não o transmita a outros. Pode prejudicá-los, mesmo que os sinais de doença sejam os mesmos que os seus.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico ou farmacêutico. Isso inclui possíveis efeitos colaterais não listados neste folheto. Consulte a seção 4.

O que tem neste folheto

1. O que é Albendazol Suspensão Oral para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Albendazol Suspensão Oral
3. Como tomar Albendazol Suspensão Oral
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como conservar Albendazol Suspensão Oral
6. Conteúdo da embalagem e outras informações.

1. O que é Albendazol Suspensão Oral para que é utilizado

Albendazol Suspensão Oral contém Albendazol que pertence a uma classe de benzimidazol de compostos anti-helmínticos e antiparasitários.

Albendazol tem a capacidade de eliminar vermes e parasitas do seu corpo, matando-os.

Albendazol Suspensão Oral é usado para tratar uma grande variedade de condições causadas por vermes ou parasitas. Estudos mostram que o albendazol é eficaz no tratamento de infecções por *Ascaris lumbricoides*, *Enterobius vermicularis*, *Necator americanus*, *Ancylostoma duodenale*, *Trichuris trichiura*, *Strongyloides stercoralis*, *Taenia spp.* e *Hymenolepis nana*; de opistorquíase (*Opisthorchis viverrini*) e larva migrans cutânea; e de giardíase (*Giardia lamblia*, *G. duodenalis*, *G. intestinalis*) em crianças.

2. O que precisa de saber antes de tomar Albendazol Suspensão Oral

Não use Albendazol Suspensão Oralse:

- você for hipersensível (alérgico) ao Albendazol, a medicamentos similares ao Albendazol (como mebendazol e tiabendazol) ou a qualquer outro componente da fórmula;
- você está grávida, suspeita de gravidez ou planeja engravidar.

Advertências

Avise seu médico antes de começar a usar este medicamento:

- se você planeja ficar grávida, está grávida ou desconfia estar grávida;
- se você está amamentando.

Albendazol Suspensão Oral contém um ingrediente chamado Benzoato de sódio, que pode causar reações alérgicas, como irritação da pele, dos olhos e das membranas ou mucosas. Se você apresentar brotoejas, coceira

ou espirros pare de usar o medicamento e procure seu médico.

O tratamento com Albendazol Suspensão Oral pode revelar casos de neurocisticercose preexistente (infecção de sistema nervosa central causada pela ingestão da larva de *Taenia spp* que se caracteriza pela presença de lesões intracerebrais calcificadas), principalmente em áreas de alta incidência de teníase. Caso você apresente convulsão ou outros sintomas neurológicos quando estiver usando o medicamento, nesse caso, a terapia com esteroides e anticonvulsivantes deve ser iniciada imediatamente, procure seu médico.

Precauções

Para evitar futuras infecções por germes ou parasitas, você deve tomar algumas medidas de prevenção.

MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO CONTRA VERMINOSES

1. Manter limpas as instalações sanitárias e lavar as mãos após utilizá-las.
2. Evitar andar descalço.
3. Cortar e manter limpas as unhas.
4. Beber água filtrada ou fervida.
5. Lavar e cozinhar bem os alimentos.
6. Manter os alimentos e os depósitos de água cobertos.
7. Combater os insetos.
8. Lavar as mãos antes das refeições.
9. Lavar os utensílios domésticos.
10. Ferver as roupas íntimas e de cama.

ESSAS MEDIDAS SE ESTENDEM A TODOS OS MEMBROS DA FAMÍLIA.

Interações com medicamentos, alimentos e exames laboratoriais

O Albendazol Suspensão Oral pode ser tomado durante ou após as refeições, ou de estômago vazio.

De modo geral, você pode continuar a tomar outros medicamentos durante o tratamento com Albendazol Suspensão Oral, exceto se estiver fazendo uso de cimetidina, praziquantel e dexametasona, pois estes medicamentos podem provocar o aumento da concentração dos metabólitos do medicamento no sangue. Já o ritonavir, a fenitoína, a carbamazepina e o fenobarbital podem reduzir as concentrações do metabólito do medicamento no sangue; quando estes forem usados concomitantemente com Albendazol Suspensão Oral.

Não se observaram interações relevantes com alimentos nem com exames laboratoriais.

Informe seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para sua saúde.

Gravidez e Lactação

O Albendazol não deve ser administrado durante a gravidez nem a mulheres que possam estar grávidas ou pensem em engravidar.

Não se sabe se o Albendazol ou seus metabólitos são excretados no leite materno. Fale com seu médico. Albendazol Suspensão Oral não deve ser usado durante a amamentação, a não ser que os benefícios

potenciais para a mãe justifiquem os possíveis riscos para o filho.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

3. Como tomar Albendazol Suspensão Oral

Não há necessidade de procedimentos especiais, tais como dieta ou uso de agentes purgantes. Siga a orientação do médico sobre a dose e os horários corretos da medicação que você deve adotar. Não tome mais do que o médico receitou. É melhor administrar ou tomar Albendazol na mesma hora todos os dias. Se você não apresentar melhora após três semanas, fale com o médico. Um segundo ciclo de tratamento pode ser necessário.

Posologia

Indicações	Idade	Dose	Período
Ascaris lumbricoides Necator americanus Trichuris trichiura	Adultos e crianças acima de 2 anos de idade	400 mg (10 ml da suspensão a 4%)	Dose única
Enterobius vermicularis Ancylostoma duodenale	Adultos e crianças acima de 2 anos de idade	400 mg (10 ml da suspensão a 4%)	Dose única
Strongyloides stercoralis Taenia spp. Hymenolepis nana	Adultos e crianças acima de 2 anos de idade	400 mg (10 ml da suspensão a 4%)	1 dose por dia durante 3 dias
Giardiasis (Giardia lamblia, G. duodenalis, G. intestinalis)	Crianças de 2 a 12 anos de idade	400 mg (10 ml da suspensão a 4%)	1 dose por dia durante 5 dias
Larva migrans cutânea	Adultos e crianças acima de 2 anos de idade	400 mg (10 ml da suspensão a 4%)	1 dose por dia por 1 a 3 dias
Opisthorchiasis (Opisthorchis viverrini)	Adultos e crianças acima de 2 anos de idade	400 mg (10 ml da suspensão a 4%)	2 doses por dia durante 3 dias

No caso de infestação por *Enterobius vermicularis*, fale com seu médico, que dará orientações sobre medidas de higiene tanto para você quanto para as pessoas que utilizam a sua moradia.

No caso de contaminação comprovada por *Hymenolepis nana*, você também deve conversar com o médico, que pode recomendar um segundo ciclo de tratamento.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico.

Se você esquecer de tomar este medicamento

Se você esquecer uma dose, tome-a assim que se lembrar e mantenha o horário normal da próxima dose. No entanto, se ao perceber que deixou de tomar uma dose você já estiver no horário da próxima, pule a dose esquecida e continue usando o medicamento nos horários normais.

Em caso de dúvida, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico ou cirurgião-dentista.

4. Possíveis efeitos colaterais

Alguns efeitos indesejáveis relatados com o uso de Albendazol Suspensão Oral estão descritos abaixo. Se você apresentar esses ou outros sintomas causados pelo uso do medicamento, informe seu médico.

Reações incomuns (ocorrem de 0,1% a 1% dos pacientes que utilizam este

medicamento): dor epigástrica ou abdominal, dor de cabeça, vertigem, enjoo e vômito ou diarreia.

Reações raras (ocorrem de 0,01% a 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): reações alérgicas (caracterizadas por coceira, vermelhidão da pele e urticária) e alterações do fígado (caracterizadas por elevações dos níveis de algumas enzimas do fígado).

5. Como conservar Albendazol Suspensão Oral

Armazenar abaixo de 30°C. Proteger da luz.

Mantener fora da vista e do alcance das crianças. Agitar bem antes de usar.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações.

Qual a composição de Albendazol Suspensão Oral

- A substância ativa é Albendazol
- Cada 5 ml contém 200 mg de Albendazol.
- Os outros ingredientes são: Sacarose, Sódio metil parabeno, Sódio propil parabeno, Benzoato de sódio, Ácido cítrico monohidratado, citrato de sódio, propilenoglicol, glicerina, Goma xantana, Tween 80, Aspartame, Sódio carboximetilcelulose.

Albendazol Suspensão Oral está disponível em frasco de vidro de 20 ml.

Este folheto foi revisto pela última vez em Dezembro de 2022.

MA Holder:



MS Lab
92 rue de Lévis
75017 PARIS FRANCE
www.mslabfrance.com

[Click Here to Know More](#)