

Amlodipina

Comprimidos de Amlodipina 5 mg/10 mg

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informação importante para si.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.

O que contém este folheto

1. O que é Comprimidos de Amlodipina e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Comprimidos de Amlodipina
3. Como tomar Comprimidos de Amlodipina
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como conservar Comprimidos de Amlodipina
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Comprimidos de Amlodipina e para que é utilizado

Comprimidos de Amlodipina pertence a um grupo de medicamentos designados por antagonistas de cálcio.

Comprimidos de Amlodipina é utilizado para tratar:

- a pressão arterial elevada (hipertensão)
- um certo tipo de dor no peito designada por angina, uma forma rara desta é a angina de Prinzmetal ou angina variante.

Nos doentes com pressão arterial elevada este medicamento provoca relaxamento dos vasos sanguíneos permitindo ao sangue passar mais facilmente.

Em doentes com angina, Comprimidos de Amlodipina atua melhorando o fornecimento de sangue ao músculo do coração que recebe mais oxigénio e como resultado previne a dor do peito. Comprimidos de Amlodipina não proporciona um alívio imediato da dor no peito devido a angina.

2. O que precisa de saber antes de tomar Comprimidos de Amlodipina

Não tome Comprimidos de Amlodipina

- Se tem alergia à Amlodipina, a qualquer outro antagonista de cálcio, ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6). Os sintomas podem incluir comichão, vermelhidão da pele ou dificuldade em respirar.
- Se tem pressão arterial baixa grave (hipotensão).
- Se tem estreitamento da válvula aórtica (estenose aórtica) ou choque cardiogénico (condição clínica onde o seu coração é incapaz de fornecer sangue suficiente ao resto do corpo).
- Se sofre de insuficiência cardíaca resultante de um ataque cardíaco.

Advertências e precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico se tem ou teve alguma das seguintes condições:

- ataque cardíaco recente
- insuficiência cardíaca
- aumento grave da pressão arterial (crise hipertensiva)
- doença do fígado
- se é idoso e a sua dose necessita de ser aumentada

Crianças e adolescentes

Comprimidos de Amlodipina não foi estudado em crianças com idade inferior a 6 anos. Comprimidos de Amlodipina apenas deve ser utilizado para a hipertensão em crianças e adolescentes entre os 6 e os 17 anos de idade (ver secção 3). Para mais informações fale com o seu médico.

Outros medicamentos e Comprimidos de Amlodipina

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos não sujeitos a receita médica.

Comprimidos de Amlodipina pode afetar ou ser afetado por outros medicamentos, tais como:

- cetoconazol, itraconazol (medicamentos antifúngicos)
- ritonavir, indinavir, nelfinavir (também designados de inibidores da protease utilizados no tratamento do VIH)
- rifampicina, eritromicina, claritromicina (antibióticos)
- hipericão (Erva de São João)
- verapamil, diltiazem (medicamentos para o coração)
- dantroleno (perfusão para alterações graves da temperatura corporal)
- sinvastatina (usada para diminuir os níveis elevados de colesterol no sangue)
- tacrolimus, ciclosporina (usados para controlar a resposta imunitária do organismo, permitindo que o corpo aceite um órgão transplantado).

Comprimidos de Amlodipina pode baixar ainda mais a sua pressão arterial se já estiver a tomar outros medicamentos para tratar a pressão arterial elevada.

Comprimidos de Amlodipina com alimentos e bebidas

Pessoas que estejam a tomar Comprimidos de Amlodipina não devem consumir sumo de toranja e toranja. A toranja e o sumo de toranja podem levar a um aumento dos níveis da substância ativa amlodipina no sangue, o que pode causar um efeito imprevisível de diminuição da pressão arterial provocada por Comprimidos de Amlodipina.

Gravidez e amamentação

Gravidez

A segurança de Comprimidos de Amlodipina na gravidez humana não foi estabelecida. Se está grávida, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Amamentação

Foi demonstrado que a Amlodipina é excretada para o leite materno em pequenas quantidades. Se está a amamentar ou vai iniciar a amamentação, fale com o seu médico antes de tomar Comprimidos de Amlodipina.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Comprimidos de Amlodipina pode afetar a sua capacidade para conduzir ou utilizar máquinas. Se os comprimidos o fazem sentir enjoado, com tonturas ou cansado, ou lhe provocam dor do cabeça, não conduza nem utilize máquinas e fale com o seu médico imediatamente.

Comprimidos de Amlodipina contém sódio

Este medicamento contém menos do que 1 mmol (23 mg) de sódio por comprimido, ou seja, é praticamente "isento de sódio".

3. Como tomar Comprimidos de Amlodipina

Tome este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

A dose inicial habitual de Comprimidos de Amlodipina é de 5 mg uma vez por dia. A dose pode ser aumentada para 10 mg de Comprimidos de Amlodipina uma vez por dia.

O seu medicamento pode ser tomado antes ou depois de alimentos e bebidas. Deve tomar o medicamento à mesma hora, todos os dias, com um copo de água. Não tome Comprimidos de Amlodipina com sumo de toranja.

Utilização em crianças e adolescentes

Em crianças e adolescentes (dos 6 aos 17 anos de idade), a dose inicial recomendada habitual é de 2,5 mg por dia. A dose máxima recomendada é de 5 mg por dia.

É importante que tome sempre os comprimidos. Não espere até os seus comprimidos acabarem para falar com o seu médico. O comprimido pode ser dividido em doses iguais.

Se tomar mais Comprimidos de Amlodipina do que deveria

Tomar demasiados comprimidos pode provocar uma descida da pressão arterial até níveis baixos ou perigosamente baixos. Pode sentir-se tonto, com a sensação de cabeça leve, a desmaiar ou fraco. Se a diminuição da sua pressão arterial for grave o suficiente, pode entrar em choque. A sua pele pode ficar fria e húmida e pode perder a consciência. Procure apoio médico imediato se tomar demasiados comprimidos de

Comprimidos de Amlodipina.

Caso se tenha esquecido de tomar Comprimidos de Amlodipina

Não se preocupe. Se se esqueceu de tomar um comprimido, esqueça essa dose. Tome a próxima dose à hora correta. Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

Se parar de tomar Comprimidos de Amlodipina

O seu médico irá dizer-lhe durante quanto tempo deverá tomar Comprimidos de Amlodipina. A sua condição pode surgir de novo se parar de tomar este medicamento antes do tempo aconselhado.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Possíveis efeitos colaterais

Como todos os medicamentos, Comprimidos de Amlodipina pode causar efeitos secundários, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Consulte o seu médico imediatamente se sentir alguns dos seguintes efeitos secundários depois de tomar este medicamento.

- Dificuldade respiratória súbita, dor no peito, falta de ar ou dificuldade em respirar
- Inchaço das pálpebras, face ou lábios
- Inchaço da língua e garganta, que causa grandes dificuldades em respirar
- Reações cutâneas graves, incluindo erupção cutânea intensa, urticária, vermelhidão da pele ao longo de todo o seu corpo, comichão intensa, bolhas, descamação e inchaço da pele, inflamação das membranas mucosas (Síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica) ou outras reações alérgicas
- Ataque cardíaco, batimentos cardíacos alterados
- Inflamação do pâncreas que pode causar dor grave abdominal e nas costas acompanhada de sensação de mal-estar

Foi notificado o efeito secundário muito frequente seguinte. Se lhe provocar problemas ou durar mais de uma semana, deverá contactar o seu médico.

Muito frequentes: podem afetar até 1 em cada 10 pessoas

- Edema (retenção de líquidos)

Foram notificados os efeitos secundários frequentes seguintes.

Se algum destes efeitos lhe provocar problemas ou durar mais de uma semana, deverá falar com o seu médico.

Frequentes: podem afetar até 1 em cada 10 pessoas

- Dor de cabeça, tonturas, sonolência (especialmente no início do tratamento)
- Palpitações (consciência do seu batimento cardíaco), rubor
- Dor abdominal, enjoos (náusea)
- Alteração dos hábitos intestinais, diarreia, prisão de ventre, indigestão
- Inchaço dos tornozelos
- Cansaço, fraqueza
- Distúrbios da visão, visão dupla
- Cãibras musculares

Outros efeitos secundários notificados estão incluídos na lista seguinte. Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detetar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Pouco frequentes: podem afetar até 1 em cada 100 pessoas

- Alterações do humor, ansiedade, depressão, insónias
- Tremores, alterações do paladar, desmaio
- Sensação de formigueiro ou adormecimento nos membros, diminuição da sensibilidade de dor
- Zumbidos nos ouvidos
- Pressão arterial baixa
- Espirros/corrimento nasal provocado por uma inflamação no revestimento do nariz (rinite)
- Tosse
- Boca seca, vômitos
- Queda de cabelo, aumento da transpiração, comichão na pele, manchas vermelhas na pele, descoloração da pele
- Alterações na passagem da urina, aumento da necessidade de urinar à noite, aumento do número de vezes que urina
- Incapacidade de obter uma ereção; desconforto ou aumento da mama nos homens
- Dor, mal-estar
- Dor nos músculos ou articulações, dor de costas
- Aumento ou diminuição de peso

Raros: podem afetar até 1 em cada 1.000 pessoas

- Confusão

Muito raros: podem afetar até 1 em cada 10.000 pessoas

- Diminuição do número de células brancas do sangue, diminuição do número de plaquetas no sangue o que pode resultar num aumento pouco comum de nódulos negros ou hemorragias
- Excesso de açúcar no sangue (hiperglicemia)
- Alteração dos nervos que pode provocar fraqueza muscular, formigueiro ou dormência
- Inchaço das gengivas
- Inchaço abdominal (gastrite)
- Alteração da função do fígado, inflamação do fígado (hepatite), amarelamento da pele (icterícia), aumento das enzimas do fígado que poderão ter efeito sobre alguns exames médicos
- Aumento da tensão muscular
- Inflamação dos vasos sanguíneos, geralmente com erupções cutâneas
- Sensibilidade à luz

Desconhecido: a frequência não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis

- tremor, postura rígida, rosto que parece uma máscara, movimentos lentos e marcha desequilibrada e arrastada.

Comunicação de efeitos secundários

Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.

5. Como conservar Comprimidos de Amlodipina

Conservar a temperatura inferior a 30°C.
Conservar na embalagem de origem para proteger da luz.

Medicamento sujeito a receita médica.

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior e no blister ou frasco, após EXP. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Comprimidos de Amlodipina

- A substância ativa é a Besilato de Amlodipina eq. ao Amlodipina.
- Cada comprimido contém Besilato de Amlodipina eq. ao Amlodipina 5 mg or 10 mg.
- Os outros componentes são: Amido de milho, Lactose, Pó de celulose microcristalina, Povidona (PVPK-30), Benzato de sódio, Estearato de magnésio, Talco purificado, Glicolato de amido de sódio e Sílica coloidal anidra.

Comprimidos de Amlodipina está disponível em embalagens de 6 x 10 Comprimidos.

Este folheto foi revisado pela última vez em Julho de 2023.

Amlodipine

Comprimés d'amlodipine 5 mg/10 mg

Veillez lire attentivement cette notice avant de commencer à prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Tu auras peut-être besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit uniquement. Vous ne devez pas le donner à d'autres. Le médicament peut leur être nocif même s'ils présentent les mêmes signes de maladie.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, y compris des effets indésirables éventuels non mentionnés dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice

1. Qu'est-ce que Comprimés d'amlodipine et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Comprimés d'amlodipine
3. Comment prendre Comprimés d'amlodipine
4. Effets secondaires possibles
5. Comment conserver les comprimés d'amlodipine
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Comprimés d'amlodipine et dans quel cas est-il utilisé

Comprimés d'amlodipine appartient à un groupe de médicaments appelés antagonistes du calcium.

Comprimés d'amlodipine est utilisé pour traiter :

- hypertension artérielle (hypertension)
- un certain type de douleur thoracique appelée angine, dont une forme rare est l'angine de Prinzmetal ou une variante de l'angine.

Chez les patients souffrant d'hypertension artérielle, ce médicament provoque le relâchement des vaisseaux sanguins, ce qui permet au sang de passer plus facilement.

Chez les patients souffrant d'angine de poitrine, Comprimés d'amlodipine agit en améliorant l'apport sanguin au muscle cardiaque qui reçoit plus d'oxygène et prévient ainsi les douleurs thoraciques. Comprimés d'amlodipine ne procure pas de soulagement immédiat des douleurs thoraciques dues à l'angine de poitrine.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Comprimés d'amlodipine

Ne prenez jamais Comprimés d'amlodipine

- Si vous êtes allergique à l'amlodipine, à tout autre antagoniste du calcium ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6). Les symptômes peuvent inclure des démangeaisons, des rougeurs de la peau ou des difficultés respiratoires.
- Si vous souffrez d'hypotension artérielle grave (hypotension).
- Si vous avez un rétrécissement de la valve aortique (sténose aortique) ou un choc cardiogénique (une condition médicale dans laquelle votre cœur est incapable de fournir suffisamment de sang au reste de votre corps).
- Si vous souffrez d'insuffisance cardiaque résultant d'une crise cardiaque.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien si vous avez ou avez eu l'une des conditions suivantes :

- crise cardiaque récente
- insuffisance cardiaque
- augmentation sévère de la pression artérielle (crise hypertensive)
- maladie du foie
- si vous êtes âgé et que votre dose doit être augmentée

Enfants et adolescents

Comprimés d'amlodipine n'a pas été étudié chez les enfants de moins de 6 ans. Comprimés d'amlodipine ne doit être utilisé que pour l'hypertension chez les enfants et les adolescents âgés de 6 à 17 ans (voir rubrique 3).

Pour plus d'informations, parlez-en à votre médecin.

Autres médicaments et Comprimés d'amlodipine

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment tout autre médicament, y compris des médicaments sans ordonnance.

- Comprimés d'amlodipine peut affecter ou être affecté par d'autres médicaments tels que :
- kétoconazole, itraconazole (médicaments antifongiques)
 - ritonavir, indinavir, nelfinavir (également appelés inhibiteurs de protéase utilisés pour traiter le VIH)
 - rifampicine, érythromycine, clarithromycine (antibiotiques)
 - Millepertuis (millepertuis)
 - vérapamil, diltiazem (médicaments pour le cœur)
 - dantrolène (inflation pour les changements sévères de la température corporelle)
 - simvastatine (utilisée pour réduire les taux élevés de cholestérol sanguin)
 - tacrolimus, ciclosporine (utilisés pour contrôler la réponse immunitaire de l'organisme, permettant à l'organisme d'accepter un organe greffé).

Comprimés d'amlodipine peut abaisser davantage votre tension artérielle si vous prenez déjà d'autres médicaments pour traiter l'hypertension artérielle.

Comprimés d'amlodipine avec des aliments et boissons

Les personnes qui prennent des Comprimés d'amlodipine ne doivent pas consommer de pamplemousse et de jus de pamplemousse. Le pamplemousse et le jus de pamplemousse peuvent entraîner une augmentation des taux de la substance active amlodipine dans le sang, ce qui peut entraîner un effet hypotenseur imprévisible causé par les comprimés d'amlodipine.

La grossesse et l'allaitement

Grossesse

La sécurité des Comprimés d'amlodipine chez la femme enceinte n'a pas été établie. Si vous êtes enceinte, pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, parlez-en à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Allaitement maternel

Il a été démontré que l'amlodipine est excrétée dans le lait maternel en petites quantités. Si vous allaitez ou êtes sur le point de commencer à allaiter, parlez-en à votre médecin avant de prendre Comprimés d'amlodipine.

Conduire des véhicules et utiliser des machines

Comprimés d'amlodipine peut affecter votre capacité à conduire ou à utiliser des machines. Si les comprimés vous donnent des nausées, des étourdissements ou de la fatigue, ou vous donnent des maux de tête, ne conduisez pas ou n'utilisez pas de machines et parlez-en immédiatement à votre médecin.

Les comprimés d'amlodipine contiennent du sodium

Ce médicament contient moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par comprimé, c'est-à-dire qu'il est essentiellement « sans sodium ».

3. Comment prendre Comprimés d'amlodipine

Prenez ce médicament exactement comme indiqué par votre médecin. Parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien si vous n'êtes pas sûr.

La dose initiale habituelle Comprimés d'amlodipine est de 5 mg une fois par jour. La dose peut être augmentée à 10 mg Comprimés d'amlodipine une fois par jour.

Votre médicament peut être pris avant ou après avoir mangé et bu. Vous devez prendre le médicament à la même heure chaque jour avec un verre d'eau. Ne prenez pas Comprimés d'amlodipine avec du jus de pamplemousse.

Utilisation chez les enfants et les adolescents

Chez les enfants et les adolescents (âgés de 6 à 17 ans), la dose initiale habituelle recommandée est de 2,5 mg par jour. La dose maximale recommandée est de 5 mg par jour.

Il est important que vous preniez toujours les comprimés. N'attendez pas que vos comprimés soient épuisés pour parler à votre médecin.

Le comprimé peut être divisé en doses égales.

Si vous avez pris plus Comprimés d'amlodipine que vous n'auriez dû

Prendre trop de comprimés peut faire chuter votre tension artérielle à des niveaux bas ou dangereusement bas. Vous pouvez vous sentir étourdi, étourdi, faible ou faible. Si la chute de votre tension artérielle est suffisamment grave, vous risquez d'être en état de choc. Votre peau peut sembler froide et moite et vous pouvez perdre connaissance. Consultez immédiatement un médecin si vous prenez trop de Comprimés d'amlodipine.

Si vous oubliez de prendre Comprimés d'amlodipine

Ne t'inquiète pas. Si vous avez oublié de prendre une pilule, oubliez cette dose. Prenez la dose suivante au bon moment. Ne prenez pas de dose double pour compenser une dose oubliée.

Si vous arrêtez de prendre Comprimés d'amlodipine

Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devrez prendre Comprimés d'amlodipine. Votre état peut réapparaître si vous arrêtez de prendre ce médicament trop tôt.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets secondaires possibles

Comme tous les médicaments, Comprimés d'amlodipine est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Consultez immédiatement votre médecin si vous ressentez l'un des effets secondaires suivants après avoir pris ce médicament.

- Difficulté respiratoire soudaine, douleur thoracique, essoufflement ou difficulté à respirer
- Gonflement des paupières, du visage ou des lèvres
- Gonflement de la langue et de la gorge, qui provoque une grande difficulté à respirer
- Réactions cutanées sévères, y compris éruption cutanée sévère, urticaire, rougeur de la peau sur tout le corps, démangeaisons sévères, cloques, desquamation et gonflement de la peau, inflammation des muqueuses (syndrome de Stevens-Johnson, nécrolyse épidermique toxique) ou autres réactions allergiques
- Crise cardiaque, rythme cardiaque anormal
- Inflammation du pancréas pouvant provoquer de fortes douleurs abdominales et dorsales accompagnées de nausées

L'effet secondaire très courant suivant a été signalé. Si cela cause des problèmes ou dure plus d'une semaine, vous devez contacter votre médecin.

Très fréquent: peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10

- (Edème (rétention d'eau))

Les effets secondaires courants suivants ont été signalés. Si l'un de ces effets vous cause des problèmes ou dure plus d'une semaine, parlez-en à votre médecin.

Fréquent: peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10

- Maux de tête, vertiges, somnolence (surtout en début de traitement)
- Palpitations (conscience de votre rythme cardiaque), bouffées vasomotrices
- Douleurs abdominales, envie de vomir (nausées)
- Modification des habitudes intestinales, diarrhée, constipation, indigestion
- Gonflement des chevilles
- Fatigue, faiblesse
- Troubles de la vision, vision double
- Crampes musculaires

Les autres effets secondaires rapportés sont inclus dans la liste ci-dessous. Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Peu fréquent: peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100

- Sautes d'humeur, anxiété, dépression, insomnie
- Tremblements, changements de goût, évanouissements
- Sensation de picotement ou d'engourdissement dans les membres, diminution de la sensation de douleur
- Bourdonnement dans les oreilles
- Pression artérielle faible
- Éternuements/nez qui coule causés par une inflammation de la muqueuse du nez (rhinite)
- Toux
- Bouche sèche, vomissements
- Perte de cheveux, transpiration accrue, démangeaisons cutanées, plaques rouges sur la peau, décoloration de la peau
- Modifications de la miction, augmentation du besoin d'uriner la nuit, augmentation du nombre de fois où vous urinez
- Incapacité à avoir une érection; inconfort ou élargissement des seins chez les hommes
- Douleur, malaise
- Douleurs musculaires ou articulaires, maux de dos
- Gain ou perte de poids

Rare: peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1 000

- Confusion

Très rare: peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10 000

- Diminution du nombre de globules blancs, diminution du nombre de plaquettes dans le sang pouvant entraîner une augmentation inhabituelle des ecchymoses ou des saignements
- Glycémie excessive (hyperglycémie)
- Trouble nerveux pouvant provoquer une faiblesse musculaire, des picotements ou des engourdissements
- Gonflement des gencives
- Gonflement abdominal (gastrite)
- Modification de la fonction hépatique, inflammation du foie (hépatite), jaunissement de la peau (jaunisse), augmentation des enzymes hépatiques pouvant affecter certains tests médicaux
- Augmentation de la tension musculaire
- Inflammation des vaisseaux sanguins, généralement accompagnée d'éruptions cutanées
- Sensibilité à la lumière

Inconnu: la fréquence ne peut être estimée à partir des données disponibles

- tremblements, posture rigide, visage qui ressemble à un masque, mouvements lents et démarche déséquilibrée et traînante.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, y compris des effets indésirables éventuels non mentionnés dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

5. Comment conserver les comprimés d'amlodipine

A conserver à une température inférieure à 30°C. Conserver dans l'emballage d'origine à l'abri de la lumière.

Médicament soumis à prescription médicale.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et sur la plaquette ou le flacon après EXP. La date de péremption correspond au dernier jour du mois indiqué.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien comment jeter les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures aideront à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Comprimés d'amlodipine

- La substance active est Bésilate d'amlodipine eq. à Amlodipine.
- Chaque comprimé contient Bésilate d'amlodipine eq. à Amlodipine 5 mg ou 10 mg.
- Les autres composants sont : Amidon de maïs, Lactose, Poudre de cellulose microcristalline, Povidone (PVPK-30), Benzoate de sodium, Stéarate de magnésium, Talc purifié, Glycolate d'amidon sodique et Silice colloïdale anhydre.

Comprimés d'amlodipine sont disponibles en boîte de 6 x 10 Comprimés.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée en Juillet 2023.