

Amoxi+Clav 875 mg/125 mg

Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informação importante para si.

- Guarde este folheto. Você pode precisar lê-lo novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado apenas para si (ou para a sua criança). Não o passe para os outros. Pode prejudicá-los, mesmo que seus sinais de doença sejam os mesmos que os seus.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico ou farmacêutico. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos colaterais não listados neste folheto. Consulte a seção 4.

O que tem neste folheto

1. O que são Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg e para que são utilizados
2. O que precisa de saber antes de tomar Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg
3. Como tomar Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como conservar os Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que são Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg e para que são utilizados

Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg é um antibiótico e funciona matando as bactérias que causam infecções. Contém dois medicamentos diferentes chamados Amoxicilina e Clavulanato de potássio. A amoxicilina pertence a um grupo de medicamentos chamados "penicilinas" que às vezes podem ser interrompidos (inativos). O outro componente ativo (ácido clavulânico) impede que isso aconteça. Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg são usados em adultos e crianças para tratar as seguintes infecções:

- infecções do ouvido médio e sinusite
- infecções do trato respiratório
- infecções do trato urinário
- infecções de pele e tecidos moles, incluindo infecções dentárias
- infecções ósseas e articulares.

2. O que precisa de saber antes de tomar Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg

Não tome Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg

- se tem alergia (hipersensibilidade) à Amoxicilina, Ácido Clavulânico, penicilina ou a qualquer outro componente de Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg (indicados na secção 6).
- se já teve uma reação alérgica (hipersensibilidade) grave a qualquer outro antibiótico. Isso pode incluir uma erupção cutânea ou inchaço do rosto ou pescoço
- se já teve problemas de fígado ou icterícia (amarelecimento da pele) ao tomar um antibiótico.

Não tome Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg se alguma das situações acima se aplicar a você.

Se tiver dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg .

Avisos e Precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento se:

- tem febre glandular
- estão a ser tratados para problemas de fígado ou rins
- não estão passando água regularmente
- Se não tiver a certeza se alguma das situações anteriores se aplica a si, fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg comprimidos.

Em alguns casos, seu médico pode

investigar o tipo de bactéria que está causando sua infecção. Dependendo dos resultados, você pode receber uma dosagem diferente de Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg ou um medicamento diferente.

Condições que você precisa observar

Os Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg podem piorar algumas condições existentes ou causar efeitos colaterais graves. Estes incluem reações alérgicas, convulsões (ataques) e inflamação do intestino grosso. Deve estar atento a certos sintomas enquanto estiver a tomar Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg, para reduzir o risco de quaisquer problemas. Consulte a Seção 4.

Exames de sangue e urina

Se você estiver fazendo exames de sangue (como testes de status de glóbulos vermelhos ou testes de função hepática) ou exames de urina (para glicose), informe o médico ou enfermeiro que está tomando Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg. Isso ocorre porque os Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg podem afetar os resultados desses tipos de testes.

Outros medicamentos e Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente ou se vier a tomar Outros medicamentos. Isso inclui medicamentos tomados sem receita médica.

Se você estiver tomando alopurinol (usado para gota) com Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg, pode ser mais provável que você tenha uma reação alérgica na pele.

Se estiver a tomar probenecida (utilizado para a gota), o seu médico pode decidir ajustar a sua dose de Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg .

Se medicamentos para ajudar a parar a formação de coágulos sanguíneos (como a varfarina) forem tomados com Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg /125 mg, podem ser necessários exames de sangue adicionais.

Os Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg podem afetar o funcionamento do metotrexato (um medicamento utilizado para tratar o cancro ou doenças reumáticas).

Os Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg podem afetar o funcionamento do micofenolato de mofetil (um medicamento utilizado para prevenir a rejeição de órgãos transplantados).

Gravidez e amamentação

Se está grávida, pensa estar grávida ou planeia engravidar, ou se está a amamentar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Condução e utilização de máquinas

Os Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg podem ter efeitos secundários e os sintomas podem torná-lo incapaz de conduzir. Não dirija ou opere máquinas a menos que esteja se sentindo bem.

3. Como tomar Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg

Tome sempre este medicamento exatamente como o seu médico lhe receitou. Consulte o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Adultos e crianças com peso igual ou superior a 40 kg

A dose habitual é

- 1 comprimido três vezes ao dia

Crianças com peso inferior a 40 kg

Crianças com 6 anos ou menos devem ser tratadas preferencialmente com Amoxicilina/Ácido Clavulânico Suspensão oral ou sachês.

Consulte o seu médico ou farmacêutico ao administrar Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg a crianças com peso inferior a 40 kg. Os comprimidos não são adequados para crianças com peso inferior a 25 kg.

Pacientes com problemas renais e hepáticos

- Se tiver problemas renais, a dose pode ser alterada. Uma dosagem diferente ou um medicamento diferente pode ser escolhido pelo seu médico.
- Se tiver problemas de fígado, poderá fazer análises ao sangue mais frequentes para verificar o funcionamento do seu fígado.

Como tomar Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg

- Engula os comprimidos inteiros com um copo de água no início de uma refeição ou um pouco antes.
- Espaçar as doses uniformemente durante o dia, com pelo menos 4 horas de intervalo. Não tome 2 doses em 1 hora.

• Não tome Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg por mais de duas semanas. Se ainda se sentir mal, deve voltar a consultar o seu médico.

Se tomar mais Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg do que deveria,

Se tomar demasiados Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg /125 mg Comprimidos, os sinais podem incluir dor de estômago (sensação de enjoo, enjoo ou diarreia) ou convulsões. Fale com o seu médico o mais rápido possível. Leve a embalagem do medicamento para mostrar ao médico.

Caso se tenha esquecido de tomar Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg

Se se esquecer de tomar uma dose, tome-a assim que se lembrar. Você não deve tomar a próxima dose muito cedo, mas espere cerca de 4 horas antes de tomar a próxima dose. Não tome uma dose dupla para compensar uma dose esquecida.

Se parar de tomar Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg

Continue a tomar Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg até terminar o tratamento, mesmo que se sinta melhor. Você precisa de cada dose para ajudar a combater a infecção. Se algumas bactérias sobreviverem, elas podem fazer com que a infecção volte.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Possíveis efeitos colaterais

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos colaterais, embora nem todos os apresentem.

Efeitos colaterais graves

Se ocorrer algum destes efeitos secundários graves, pare de tomar o medicamento e informe o seu médico imediatamente ou dirija-se ao serviço de urgência do hospital mais próximo.

Reações alérgicas:

- inflamação dos vasos sanguíneos (vasculite) que pode ser visível como manchas vermelhas ou roxas na pele, mas pode afetar outras partes do corpo
- febre, dor nas articulações, glândulas inchadas no pescoço, axilas ou virilha
- inchaço, por vezes da face ou boca (angioedema), causando dificuldade em respirar
- colapso
- uma erupção cutânea generalizada com bolhas e descamação da pele, particularmente ao redor da boca, nariz, olhos e genitais (síndrome de Stevens-Johnson), e uma forma mais grave, causando descamação extensa da pele (mais de 30% da superfície do corpo – tóxico necrólise epidérmica)
- erupção cutânea, que pode formar bolhas e se assemelha a pequenos alvos (manchas escuras centrais cercadas por uma área mais pálida, com um anel escuro ao redor da borda – eritema multiforme)
- erupção cutânea vermelha disseminada com pequenas bolhas contendo pus (dermatite esfoliativa bolhosa)
- uma erupção cutânea vermelha e escamosa com inchaços sob a pele e bolhas (pustulose exantemática)
- sintomas semelhantes aos da gripe com erupção cutânea, febre, glândulas inchadas e resultados anormais de exames de sangue (incluindo aumento de glóbulos brancos (eosinofilia) e enzimas hepáticas) (Reação medicamentosa com eosinofilia e sintomas sistêmicos (DRESS))

Os seguintes efeitos colaterais graves também foram relatados:

- inflamação do intestino grosso, causando diarreia aquosa geralmente com sangue e muco, dor de estômago e/ou febre
- inflamação do fígado (hepatite)
- icterícia, causada pelo aumento da

bilirrubina no sangue (uma substância produzida no fígado) que pode tornar a sua pele e a parte branca dos olhos amareladas

- convulsões (em pessoas que tomam altas doses de Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg ou que têm problemas renais)
- o sangue demora mais para coagular

Outros efeitos colaterais

Se tiver algum destes efeitos secundários, fale com o seu médico o mais rapidamente possível.

Muito frequentes: podem afetar mais de 1 em cada 10 pessoas

- diarreia (em adultos)

Frequentes: podem afetar até 1 em 10 pessoas

- aftas (candida - uma infecção fúngica da vagina, boca ou dobras cutâneas)
- sensação de enjoo (náuseas), especialmente ao tomar altas doses
- se afetado, tome Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg antes das refeições
- vômito
- diarreia (em crianças)

Pouco frequentes: podem afetar até 1 em 100 pessoas

- erupção cutânea, comichão
- erupção cutânea com comichão (urticária)
- indigestão
- tontura
- dor de cabeça

Efeitos colaterais que podem aparecer em seus exames de sangue:

- aumento de algumas substâncias (enzimas) produzidas pelo fígado

Raros: podem afetar até 1 em 1.000 pessoas

Efeitos colaterais que podem aparecer em seus exames de sangue:

- baixo número de células envolvidas na coagulação do sangue
- baixo número de glóbulos brancos

Desconhecido: a frequência não pode ser estimada a partir dos dados disponíveis

- inflamação dos tubos nos rins
- hiperatividade
- língua preta que parece peluda
- inflamação da membrana protetora que envolve o cérebro (meningite asséptica)

Efeitos colaterais que podem aparecer em seus exames de sangue ou urina:

- redução severa no número de glóbulos brancos
- baixo número de glóbulos vermelhos (anemia hemolítica)
- cristais na urina

Relato de efeitos colaterais

Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico ou farmacêutico. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos colaterais não listados neste folheto.

5. Como conservar os Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg

Armazenar abaixo de 30°C. Proteger da luz e da umidade.

Manter o medicamento em embalagem original.

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

Medicamento Sujeito a receita Médica.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição dos Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg /125 mg

As substâncias ativas são Amoxicilina e Ácido Clavulânico.

Cada comprimido revestido por película contém Amoxicilina Trihidrata equivalente a 875 mg de Amoxicilina e Clavulanato de Potássio equivalente a 125 mg de Acido Clavulânico.

Os outros componentes são Celulose microcristalina, Amidoglicolato de sódio, Sílica coloidal anidra, Estearato de magnésio, Croscarmelose sódica, Mistura pronta Branco (Opadry Branco 21K58794), Álcool isopropílico (anidro), Cloreto de metileno (anidro), Talco.

Amoxicilina e Clavulanato Potássio Comprimidos 875 mg/125 mg está disponível em caixinha de 1 x 10 Comprimidos.

Este folheto foi revisto pela última vez em Dezembro de 2022.

MA Holder:



MS Lab
92 rue de Lévis
75017 PARIS FRANCE
www.ms-labfrance.com

[Click Here to Know More](#)