

# Amoxicilina

## Amoxicilina Cápsulas 500 mg

**Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento.**

- Guarde este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não o transmita a outros. Pode prejudicá-los, mesmo que os sinais de doença sejam os mesmos que os seus.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico ou farmacêutico. Isso inclui possíveis efeitos colaterais não listados neste folheto. Consulte a seção 4

### O que há neste folheto:

1. O que são Amoxicilina Cápsulas e para que são utilizadas
2. O que precisa de saber antes de tomar Amoxicilina Cápsulas
3. Como tomar Amoxicilina Cápsulas
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como conservar Amoxicilina Cápsulas
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

### 1. O que são Amoxicilina Cápsulas e para que são utilizadas

Amoxicilina Cápsulas contém Amoxicilina como ingrediente ativo que pertence a uma classe de antibióticos chamados “penicilinas”. Amoxicilina Cápsulas são usadas para tratar infecções causadas por bactérias em diferentes partes do corpo. Amoxicilina Cápsulas também podem ser usadas em combinação com outros medicamentos para tratar úlceras estomacais.

### 2. O que precisa de saber antes de tomar Amoxicilina Cápsulas

Não tome Amoxicilina Cápsulas

- se tem alergia à Amoxicilina, Penicilina ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6)
- se já teve uma reação alérgica a qualquer antibiótico. Isso pode incluir uma erupção cutânea ou inchaço da face ou garganta.
- Não tome Amoxicilina se alguma das situações acima se aplicar. Se tiver dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Amoxicilina.

### Avisos e Precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Amoxicilina Cápsulas se:

- tem problemas renais
- tem febre glandular (febre, dor de garganta, gânglios inchados e cansaço extremo)
- não estão urinando regularmente
- Se não tiver a certeza se alguma das situações acima se aplica a si, fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Amoxicilina.

### Fazer exames de urina ou sangue

Se você está tendo:

- Exames de urina (glicose) ou exames de sangue para função hepática
  - Testes de estriol (usados durante a gravidez para verificar se o bebê está se desenvolvendo normalmente)
- Informe o seu médico ou farmacêutico que está a tomar Amoxicilina. Isso ocorre porque a Amoxicilina pode afetar os resultados desses testes.

### Outros medicamentos e Amoxicilina Cápsulas

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente ou se vier a tomar outros medicamentos.

- Se estiver a tomar alopurinol (usado para a gota) com Amoxicilina, pode ser mais provável que tenha uma reação alérgica cutânea.
- Se estiver a tomar probenecida (usado para a gota), o seu médico pode decidir ajustar a dose de Amoxicilina.
- Se estiver a tomar medicamentos para ajudar a parar os coágulos sanguíneos (como a varfarina), poderá necessitar de análises sanguíneas adicionais.
- Se estiver a tomar outros antibióticos (como a tetraciclina), a Amoxicilina pode ser menos eficaz.
- Se estiver a tomar metotrexato (usado para o tratamento do cancro e da psoríase grave), a Amoxicilina pode causar um aumento dos efeitos secundários.
- Amoxicilina Cápsulas com alimentos e bebidas

Estas cápsulas podem ser tomadas antes,

durante ou após as refeições.

### Gravidez e amamentação

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento. A Amoxicilina passa para o leite materno, por isso informe o seu médico se estiver a amamentar. Consulte o seu médico antes de tomar qualquer medicamento.

### Condução e utilização de máquinas

A Amoxicilina pode ter efeitos secundários e os sintomas (tais como reações alérgicas, tonturas e convulsões) podem torná-lo incapaz de conduzir.

Não dirija ou opere máquinas a menos que esteja se sentindo bem.

### 3. Como tomar Amoxicilina Cápsulas

Tome este medicamento sempre de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

- Engula com água sem abrir a cápsula.
- Espace as doses uniformemente durante o dia, com pelo menos 4 horas de intervalo.

A dose recomendada é:

#### Crianças com peso inferior a 40kg

Todas as doses são calculadas dependendo do peso corporal da criança em quilogramas.

- O seu médico irá aconselhá-la sobre a quantidade de Amoxicilina Cápsulas que deve dar ao seu bebé ou criança.
- A dose habitual é de 40 mg a 90 mg por cada quilograma de peso corporal por dia, administrada em duas ou três doses divididas.
- A dose máxima recomendada é de 100 mg por cada quilograma de peso corporal por dia.

#### Adultos, idosos e crianças com peso igual ou superior a 40 kg

A dose habitual de Amoxicilina é de 250 mg a 500 mg três vezes ao dia ou 750 mg a 1 g a cada 12 horas, dependendo da gravidade e do tipo de infecção.

- **Infecções graves:** 750 mg a 1 g três vezes ao dia
- **Infecção do trato urinário:** 3 g duas vezes ao dia por um dia.
- **Doença de Lyme (uma infecção disseminada por parasitas chamados carrapatos):** Eritema migratório isolado (fase inicial - erupção cutânea circular vermelha ou rosa): 4 g por dia, Manifestações sistêmicas (fase tardia - para sintomas mais graves ou quando a doença se espalha pelo corpo) : até 6 g por dia.
- **Úlceras estomacais:** uma dose de 750mg ou 1 g duas vezes ao dia durante 7 dias com outros antibióticos e medicamentos para tratar úlceras estomacais.
- **Para prevenir infecção cardíaca durante a cirurgia:** a dose varia de acordo com o tipo de cirurgia. Outros medicamentos também podem ser administrados ao mesmo tempo. O seu médico, farmacêutico ou enfermeiro pode dar-lhe mais detalhes.
- A dose máxima recomendada é de 6 g por dia.

#### Problemas renais

Se tiver problemas renais, a dose pode ser inferior à dose habitual.

#### Se tomar mais Amoxicilina Cápsulas do que deveria

Se você tomou Amoxicilina Cápsulas em excesso, os sinais podem ser dor de estômago (sensação de enjoo, enjoo ou diarreia) ou cristais na urina, que podem ser vistos como urina turva ou problemas para urinar. Fale com o seu médico assim que possível. Leve o remédio para mostrar ao médico.

#### Caso se tenha esquecido de tomar Amoxicilina Cápsulas

- Caso se esqueça de tomar uma dose, tome-a assim que se lembrar.
- Não tome a próxima dose muito cedo, espere cerca de 4 horas antes de tomar a próxima dose.
- Não tome uma dose dupla para compensar uma dose esquecida.

#### Por quanto tempo você deve tomar amoxicilina

- Continue a tomar Amoxicilina durante o tempo indicado pelo seu médico, mesmo

que se sinta melhor. Você precisa de todas as doses para ajudar a combater a infecção. Se algumas bactérias sobreviverem, elas podem causar o retorno da infecção.

- Depois de terminar o tratamento, se ainda se sentir mal, deve voltar a consultar o médico.

Pode ocorrer candidíase (uma infecção por fungos nas áreas úmidas do corpo que pode causar dor, coceira e corrimento branco) se Amoxicilina for usado por um longo período de tempo. Se isto ocorrer informe o seu médico.

Se você tomar Amoxicilina por um longo período de tempo, seu médico poderá realizar exames adicionais para verificar se seus rins, fígado e sangue estão funcionando normalmente.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

#### 4. Possíveis efeitos colaterais

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

**Pare de tomar Amoxicilina Cápsulas e consulte um médico imediatamente se notar algum dos seguintes efeitos secundários graves - pode necessitar de tratamento médico urgente:**

Os seguintes são muito raros (podem afetar até 1 em 10.000 pessoas)

- reacções alérgicas, os sinais podem incluir: comichão ou erupção cutânea, inchaço da face, lábios, língua, corpo ou dificuldades respiratórias. Estes podem ser graves e, ocasionalmente, ocorrerem mortes
- erupção cutânea ou pontos redondos vermelhos planos sob a superfície da pele ou hematomas na pele. Isto é devido a uma inflamação das paredes dos vasos sanguíneos devido a uma reacção alérgica. Pode estar associada a dores nas articulações (artrite) e problemas renais.
- pode ocorrer uma reacção alérgica tardia geralmente 7 a 12 dias após a administração de Amoxicilina, alguns sinais incluem: erupções cutâneas, febre, dores nas articulações e aumento dos gânglios linfáticos, especialmente nas axilas
- uma reacção cutânea conhecida como “eritema multiforme” onde pode desenvolver: manchas roxas avermelhadas com comichão na pele, especialmente nas palmas das mãos ou solas dos pés, áreas inchadas e elevadas tipo “colmeia” na pele, áreas sensíveis na as superfícies da boca, olhos e órgãos genitais. Você pode ter febre e estar muito cansado.
- outras reacções cutâneas graves podem incluir: alterações na cor da pele, inchaços sob a pele, bolhas, pústulas, descamação, vermelhidão, dor, comichão, descamação. Estes podem estar associados a febre, dores de cabeça e dores no corpo.
- febre, calafrios, dor de garganta ou outros sinais de infecção, ou se você se machucar facilmente. Estes podem ser sinais de um problema com as suas células sanguíneas
- sintomas semelhantes aos da gripe com erupção cutânea, febre, gânglios inchados e resultados anormais das análises ao sangue (incluindo aumento dos glóbulos brancos (eosinofilia) e das enzimas hepáticas) (reacção medicamentosa com eosinofilia e sintomas sistémicos (DRESS)).
- a reacção de Jarisch-Herxheimer que ocorre durante o tratamento com Amoxicilina para a doença de Lyme e causa febre, calafrios, dor de cabeça, dor muscular e erupção cutânea.
- inflamação do intestino grosso (cólon) com diarreia (às vezes contendo sangue), dor e febre
- podem ocorrer efeitos secundários hepáticos graves. Eles estão associados principalmente a pessoas em tratamento por um longo período, homens e idosos. Deve informar o seu médico com urgência se tiver:
  - diarreia grave com sangramento
  - bolhas, vermelhidão ou hematomas na pele
  - urina mais escura ou fezes mais claras
  - amarelecimento da pele ou da parte branca dos olhos (icterícia).

Veja também anemia abaixo que pode resultar em icterícia.

Estes podem acontecer durante a administração do medicamento ou até várias semanas depois.

**Se alguma das situações acima acontecer, pare de tomar o medicamento e consulte o seu médico imediatamente. Às vezes, você pode ter reacções cutâneas menos graves, como:**

- uma erupção cutânea com comichão ligeira (manchas redondas rosa-avermelhadas), áreas inchadas tipo colmeia nos antebraços, pernas, palmas das mãos, mãos ou pés. Isto é pouco frequente (pode afetar até 1 em cada 100 pessoas).

**Se tiver algum destes, fale com o seu médico, uma vez que a Amoxicilina terá de ser interrompida.**

Os outros possíveis efeitos colaterais são:

**Frequentes** (podem afetar até 1 em cada 10 pessoas)

- erupção cutânea
- sentir-se enjoado (náuseas)
- diarreia

**Pouco frequentes** (podem afetar até 1 em 100 pessoas)

- estar enjoado (vomitar).

**Muito raros** (podem afetar até 1 em 10.000 pessoas)

- candidíase (uma infeção fúngica da vagina, boca ou dobras da pele), pode obter tratamento para aftas com o seu médico ou farmacêutico
- problemas renais
- convulsões (convulsões), observadas em doentes a tomar doses elevadas ou com problemas renais
- tontura
- hiperatividade
- cristais na urina, que podem ser vistos como urina turva, ou dificuldade ou desconforto em urinar. Certifique-se de beber muitos líquidos para reduzir a chance desses sintomas.
- a língua pode mudar para amarelo, marrom ou preto e pode ter uma aparência peluda.
- uma degradação excessiva dos glóbulos vermelhos causando um tipo de anemia. Os sinais incluem: cansaço, dores de cabeça, falta de ar, tonturas, palidez e amarelecimento da pele e do branco dos olhos.
- baixo número de glóbulos brancos
- baixo número de células envolvidas com a coagulação do sangue
- o sangue pode demorar mais para coagular do que normalmente. Você pode perceber isso se tiver uma hemorragia nasal ou se cortar.
- inflamação da membrana protetora que envolve o cérebro (meningite asséptica).

#### Relato de efeitos colaterais

Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico ou farmacêutico. Isso inclui possíveis efeitos colaterais não listados neste folheto.

#### 5. Como conservar as Amoxicilina Cápsulas

Armazenar abaixo de 30°C. Proteger da luz e da umidade.

Manter o medicamento em embalagem original.

Medicamento Sujeito a receita Médica.

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

#### 6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Amoxicilina Cápsulas

A substância ativa é a Amoxicilina

Trihidratada Eq. ao Amoxicilina.

Cada cápsula de gelatina dura contém Amoxicilina Trihidratada Eq. ao Amoxicilina 500 mg.

Os outros componentes são Estearato de magnésio e Talco Purificado.

Amoxicilina Cápsulas está disponível em caixinha de 2 x 10 Capsulas.

Este folheto foi revisado pela última vez em Dezembro de 2022.

MA Holder:

 MS Lab  
92 rue de Lévis  
75017 PARIS FRANCE  
www.mslabfrance.com

[Click Here to Know More](#)