

Clotrimazol

Clotrimazol Creme Vaginal 1%

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento, pois contém informação importante para si.

Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário utilizar Clotrimazol Creme Vaginal com precaução para obter os devidos resultados.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico.
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

O que tem neste folheto:

1. O que é Clotrimazol Creme Vaginal e para que é utilizado
2. O que você precisa saber antes de usar Clotrimazol Creme Vaginal
3. Como utilizar Clotrimazol Creme Vaginal
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como conservar Clotrimazol Creme Vaginal
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Clotrimazol Creme Vaginal e para que é utilizado

Clotrimazol Creme Vaginal contém a substância activa Clotrimazol pertencente a um grupo de substâncias conhecido como "antifúngicos".

O Clotrimazol possui um amplo espectro de actividade o que lhe permite a eliminação eficaz de um grande número de fungos, responsáveis por várias infecções da pele (dermatomicoses) e genitais nomeadamente candidíase vaginal que afecta a zona vaginal (vaginite).

A candidíase vaginal é uma infecção causada por um fungo designado *Candida* que ocorre com alguma frequência em mulheres. Este fungo (*Candida*) encontra-se na pele humana, fezes e vagina podendo em certas situações tornar-se patogénico. Os sintomas da candidíase vaginal são prurido (comichão), rubor, corrimento esbranquiçado e odor desagradável.

Clotrimazol Creme Vaginal é utilizado para tratamento de infecções genitais localizadas na vagina, vulva ou pénis provocadas por um fungo chamado *Candida*:

Candidíase vaginal recorrente com diagnóstico médico prévio. Esta situação é caracterizada por corrimento vaginal esbranquiçado, acompanhado de prurido (comichão) vaginal e habitualmente mais acentuada antes da menstruação.

Tratamento local de infecções dos lábios genitais (vulva) e áreas adjacentes, bem como inflamação da glândula e prepúcio no pénis, do parceiro sexual (Candidíase balânica).

2. O que você precisa saber antes de usar Clotrimazol Creme Vaginal

Não utilize Clotrimazol Creme Vaginal

- se tem alergia (hipersensibilidade) ao Clotrimazol ou a qualquer outro componente de Clotrimazol Creme Vaginal.
- Consulte também o capítulo "Outras informações" para verificar se é alérgico ou intolerante a algum dos componentes, em especial ao componente álcool cetosteárilico.
- Se não tem a certeza de já ter tido qualquer alergia devida ao Clotrimazol consulte o seu médico.
- Crianças com idades inferiores a 15 anos não devem utilizar o aplicador vaginal.

Tome especial cuidado com Clotrimazol Creme Vaginal

- Quando utilizado com produtos à base de látex (ex: preservativos e diafragma): verifica-se uma redução da eficácia e da segurança destes produtos
- este efeito é temporário e pode prolongar-se até 5 dias após a interrupção do tratamento, devendo utilizar-se precauções alternativas;
- O tratamento deverá estar concluído antes do início da menstruação. Durante o período menstrual não se deverá efectuar o tratamento;
- Nos três primeiros meses da gravidez, é necessário especial precaução se houver utilização vaginal;
- Clotrimazol Creme Vaginal não pode ser utilizado por crianças, mas pode ser utilizado por pessoas idosas.

Ao utilizar Clotrimazol Creme Vaginal com outros medicamentos

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

Neste caso, não se conhecem alterações do efeito de Clotrimazol Creme Vaginal pelo facto de se utilizar outros medicamentos.

Gravidez e aleitamento

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Não foram observados efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas.

Informações importantes sobre alguns componentes de Clotrimazol Creme Vaginal

- devido à presença dos álcoois estearílico e cetílico na composição do creme, Clotrimazol Creme Vaginal pode causar reacções cutâneas locais (por exemplo dermatite de contacto).
- Clotrimazol Creme Vaginal contém parahidroxibenzoato de butilo na sua composição, como tal, pode causar reacções alérgicas (possivelmente

retardadas).

3. Como utilizar Clotrimazol Creme Vaginal

Utilizar Clotrimazol Creme Vaginal sempre de acordo com as indicações do médico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Introduzir 1 aplicador cheio de Creme Vaginal o mais profundamente possível na vagina, uma vez por dia, ao deitar, durante 6 a 12 dias.

Recomenda-se que a aplicação seja feita com a doente deitada de costas e com as pernas flectidas.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

A. Aplicação do Creme Vaginal com aplicador.

1. Puxar completamente o êmbolo do aplicador até prender.
 2. Abrir a bisnaga. Ajustar o aplicador à bisnaga, mantendo-o firmemente encaixado e encher o aplicador, apertando cuidadosamente a bisnaga.
 3. Retirar o aplicador da bisnaga. Introduzir o aplicador o mais profundamente possível na vagina (de preferência na posição de decúbito dorsal) e ir empurrando o êmbolo até esvaziar completamente o conteúdo do aplicador.
 4. Retirar o aplicador e deitá-lo fora.
- Para tratar infecções dos lábios genitais (vulva) da mulher ou inflamação da glândula e prepúcio no pênis do parceiro sexual (Candidíase balânica), aplicar o creme 2 - 3 vezes por dia, em camada fina, às zonas afectadas (na mulher: órgãos genitais externos até ao ânus; no homem: glândula e prepúcio no pênis), friccionando ligeiramente em seguida.
- Nestas situações o período normal de tratamento é de 1 - 2 semanas.

Se:

- Os lábios ou as áreas adjacentes estiverem simultaneamente inflamadas, deverá informar o seu médico porque vai precisar de efectuar tratamento local aplicando o Creme Vaginal.
- O seu parceiro sexual apresente sintomas como comichão ou inflamação nos órgãos genitais deverá informar o médico pois poderá haver também necessidade de ele efectuar tratamento local adequado.
- Tem idade inferior a 15 anos, consulte o seu médico antes de utilizar o medicamento.
- Num período de 6 meses tiver mais que 2 infecções e se houver febre, corrimento com cheiro fétido ou dores pélvicas deve ser consultado um médico.

Se utilizar mais Clotrimazol Creme Vaginal do que deveria Não se aplica.

Caso se tenha esquecido de utilizar Clotrimazol Creme Vaginal

Se se esqueceu de aplicar o medicamento deverá retomar a aplicação sem todavia utilizar mais quantidade de creme do que a indicada (1 aplicador cheio por dia).

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Possíveis efeitos Colaterais

Como todos os medicamentos, Clotrimazol

Creme Vaginal pode causar efeitos colaterais, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

Os efeitos adversos mais frequentes são os que se manifestam localmente, tais como irritação, sensação de queimadura e prurido. Podem ocorrer ainda eritema (vermelhidão na pele), edema (inchaço), vesiculação (formação de bolhas), queratólise e urticária. A dermatite de contacto é pouco frequente. Existem ainda relatos de agravamento da dermatite vulvar. Se algum dos efeitos colaterais se agravar ou se detectar quaisquer efeitos colaterais não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5. Como conservar Clotrimazol Creme Vaginal

Conservar a temperatura inferior a 25°C. Não congelar.

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

Manter o bisnaga bem fechado após o uso.

Somente para uso externo.

Apenas Para Uso Vaginal.

Não utilize Clotrimazol Creme Vaginal após o prazo de validade impresso na embalagem. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado. Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico.

Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não necessita.

Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Clotrimazol Creme Vaginal

- A substância activa é o Clotrimazol
- Clotrimazol Creme Vaginal contains 1% de Clotrimazol.
- Os outros componentes são Álcool Cetoestearílico, Keto Microgrol 1000, Parafina Mole Branca, Parafina Líquida Leve, Propileno Glicol, Metil Parabeno, Propil Parabeno, Hidroxi Tolueno Butilado, Pará Cloro Meta Cresol, EDTA dissódico, óleo de silicone, água purificada.

Clotrimazole Creme Vaginal está disponível em embalagem de Bisnaga de 50 g com 7 aplicadores.

Este folheto foi revisado pela última vez em Dezembro de 2022.

MA Holder:

 MS Lab
92 rue de Lévis
75017 PARIS FRANCE
www.ms-labfrance.com

[Click Here to Know More](#)