

Diclofenac MS-Lab 10 mg/g Gel

Diclofenaco de Sódio

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento, pois contém informação importante para si.

Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos colaterais, incluindo possíveis efeitos colaterais não indicados neste folheto, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Ver secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar após 7 dias, tem de consultar um médico.

O que têm neste folheto:

1. O que é Diclofenac Gel e para que é utilizados
2. O que precisa de saber antes de utilizar Diclofenac Gel
3. Como utilizar Diclofenac Gel
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como conservar Diclofenac Gel
6. Conteúdo do embalagem e outras informações

1. O que é Diclofenac Gel e para que é utilizados

Diclofenac Gel é um medicamento que se apresenta na forma de gel, para aplicação tópica na pele.

Diclofenac Gel pertence a um grupo de medicamentos designados por anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) para uso tópico (grupo farmacoterapêutico: 9.1.10).

O Diclofenac Gel é utilizado para aliviar a dor e reduzir a inflamação e o inchaço em numerosas condições dolorosas que afetam as articulações e músculos. Pode ser utilizado para:

Adultos e adolescentes com idade igual ou superior a 14 anos:

Tratamento sintomático (alívio da dor, inflamação e tumefação) de:

1. Dores musculares ligeiras a moderadas;
2. Inflamação pós-traumáticas dos tendões, ligamentos, músculos e articulações (entorses, luxações e contusões);

Adultos (a partir dos 18 anos):

3. Formas localizadas de reumatismo degenerativo: osteoartrose das articulações periféricas e coluna vertebral.

2. O que precisa de saber antes de utilizar Diclofenac Gel

Não utilize Diclofenac Gel:

- Se tem alergia ao Diclofenac ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6);
- Se sofreu anteriormente de crises de asma, urticária ou rinite aguda, desencadeadas pelo ácido acetilsalicílico ou por outros fármacos anti-inflamatórios não esteroides;
- Se está no último trimestre da gravidez;
- Se tiver menos de 14 anos de idade.

Advertências e precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar Diclofenac Gel

- Não aplique Diclofenac Gel em superfícies cutâneas infetadas, nem em feridas ou lesões abertas, só devendo

ser aplicado em superfícies de pele intacta e saudável; este medicamento também não deve ser aplicado no interior da boca ou da vagina.

- Evite o contacto de Diclofenac Gel com os olhos. Caso ocorra, lave os olhos com água corrente e avise o seu médico.
- Nunca ingira Diclofenac Gel.
- Diclofenac Gel pode ser usado com pensos não oclusivos, mas não deve ser usado com pensos herméticos oclusivos.

Outros medicamentos e Diclofenac Gel

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.

Gravidez e amamentação

Gravidez

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar este medicamento.

Dado não existirem dados sobre o uso de Diclofenac Gel na mulher grávida, não se recomenda a utilização durante a gravidez. Diclofenac Gel está contraindicado durante o terceiro trimestre.

Amamentação

Não se sabe se o diclofenac tópica é excretado no leite humano, pelo que o gel de diclofenac não é recomendado durante a oinomentnção. Se houver razões poro usar Diclofenac Gel durante a amamentação, não deve ser aplicado no peito ou em grandes áreas da pele, nem deve ser usado por um período prolongado.

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Não foram referidos quaisquer efeitos.

3. Como utilizar Diclofenac Gel

Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Adultos e adolescentes a partir dos 14 anos:

Diclofenac Gel deve ser aplicado na pele 3 ou 4 vezes por dia, friccionando levemente na pele. A quantidade necessária depende dos dimensões da zona doloroso: 2 - 4g Diclofenac Gel (quantidade cujas dimensões aproximadas variam entre uma cereja e uma noz) é suficiente para tratar uma área de, aproximadamente, 400-800 cm².

Após a aplicação, deve-se lavar as mãos, exceto no caso em que estas sejam o local a tratar.

Duração do tratamento

A duração do tratamento depende da indicação e da resposta obtido.

- Para lesões e/ou reumatismo nos tecidos moles: O gel não deve ser usado mais do que 14 dias, exceto se recomendado por um médico.
- Para as dores de artrites (apenas para adultos a partir dos 18 anos):

A duração do tratamento é até 21 dias,

exceto se recomendado por um médico

Quando usado sem prescrição médica, para qualquer uma das indicações mencionadas acima, se o doente não melhorar num período de 7 dias ou se piorar, deverá consultar o seu médico

Crianças e adolescentes abaixo dos 14 anos:

Os dados de eficácia e segurança são insuficientes para crianças e adolescentes abaixo dos 14 anos (ver também secção 4.3 Contraindicações)

Nos adolescentes com mais de 14 anos, se este medicamento for necessário por mais de 7 dias para o alívio da dor ou se os sintomas piorarem, o doente/pais do adolescente são aconselhados a consultar um médico.

Caso se tenha esquecido de utilizar Diclofenac Gel

Não aplique uma dose a dobrar para compensar a dose que se esqueceu. Aplique a dose esquecida logo que possível e retome o intervalo habitual entre as doses.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Possíveis efeitos colaterais

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos colaterais, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Os efeitos indesejáveis incluem reação do pele ligeira e passageira no local de aplicação. Em muitos casos raros podem ocorrer reações alérgicas.

As reações adversas estão agrupadas por grau de frequência, primeiro as mais frequentes, usando a seguinte convenção:

Muito frequentes ($\geq 1/10$)
Frequentes ($\geq 1/100$, $< 1/10$);
Pouco frequentes ($\geq 1/1.000$, $< 1/100$),
Raros ($\geq 1/10.000$, $< 1/1.000$);
Muito raras ($< 1/10.000$), incluindo relatos isolados.

Infeções e infestações
Muito raras: rash pustular

Doenças do sistema imunitário
Muito raras: hipersensibilidade (incluindo urticária), angioedema.

Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino
Muito raras: asthma
Doenças da pele e dos tecidos subcutâneos
Comuns: rash, eczema, eritemo, dermatite (incluindo dermatite de contacto)
Raras: dermatite bolhosa
Muito raras: reações de fotossensibilidade

Se algum dos efeitos colaterais se agravar ou se detetar quaisquer efeitos colaterais não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Comunicação de efeitos colaterais

Se tiver quaisquer efeitos colaterais, incluindo possíveis efeitos colaterais não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.

5. Como conservar Diclofenac Gel

Armazenar abaixo de 30°C em local seco. Proteger da luz. Não congelar.

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

Medicamento Não Sujeto a Receita Medica.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem. O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações contem

Qual a composição de Diclofenac Gel

- A substância ativa é o Diclofenaco de Sódio.
- Cada grama de gel contém 10 mg de Diclofenaco de Sódio.
- Os outros componentes são: Hidróxido de sódio, ACRYPOL 940, EDTA dissódico, Álcool benzílico, ACRY SOL K 140, Propilenoglicol e Álcool isopropílico.

Diclofenac Gel esta disponível em bisnaga de 50 g 100 g.

Este Folheto foi revisado pela última vez em Dezembro de 2022.

MA Holder:



MS Lab
92 rue de Lévis
75017 PARIS FRANCE
www.ms-labfrance.com

[Click Here to Know More](#)