

# Exomol 500

Comprimidos de Paracetamol 500 mg

**Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informação importante para si.**

- Guarde este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Esse remédio foi receitado para você. Não o passe para os outros. Pode prejudicá-los, mesmo que os sintomas deles são os mesmos que os seus.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos colaterais não listados neste folheto. Consulte a seção 4.

## O que tem neste folheto

1. O que é Exomol 500 e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Exomol 500
3. Como tomar Exomol 500
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como conservar Exomol 500
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

### 1. O que é Exomol 500 e para que é utilizado

Os Exomol 500 pertencem a um grupo de medicamentos denominados Analgésicos e Antipiréticos. Ele funciona por aliviar a dor e reduzir a alta temperatura e febre. Os Exomol 500 são usados para o alívio da dor leve a moderada, incluindo dor de cabeça, enxaqueca, dores de cabeça tensionais, neuralgia (dor severa nos nervos), dor nas costas, dor de dente, dor de garganta, dor menstrual, alívio sintomático de entorses, distensões, dor reumática, ciática, lombalgia e dor nas pernas), lumbago (dor lombar), fibrosite (dor muscular e do tecido conjuntivo), dores musculares, inchaço e rigidez das articulações, gripe, febre e resfriados febris. Também pode ser usado para alívio sintomático da dor devido à artrite não grave.

### 2. O que precisa de saber antes de tomar Exomol 500

#### Não tome Exomol 500 :

- Se tem alergia ao Exomol 500 ou a qualquer um dos excipientes.

- Se estiver a tomar outros
- produtos que contenham Exomol 500.
- Se você tem menos de 10 anos de idade.

Tome especial cuidado com Exomol 500

Antes de tomar Exomol 500, informe o seu médico se:

- sofre de doença hepática ou renal, incluindo doença hepática alcoólica não cirrótica.

Tomar outros medicamentos

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo os medicamentos obtidos sem receita médica.

Em particular, informe o seu médico se estiver a tomar algum dos seguintes medicamentos:

- Anticoagulantes para diluir o sangue, por exemplo. varfarina
- Alguns antibióticos, por ex. cloranfenicol
- Medicamentos para controlar náuseas e vômitos, por exemplo. metoclopramida, domperidona
- Medicamentos para controlar os níveis elevados de lípidos, por ex. colestiramina

### Gravidez e amamentação

Informe o seu médico se estiver grávida ou a planejar engravidar, ou se estiver a amamentar.

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer outro medicamento.

Se necessário, os Exomol 500 podem ser usados durante a gravidez. Você deve usar o menor valor possível dose que reduza sua dor e/ou sua febre e use-a pelo menor tempo possível. Entre em contato com seu médico se a dor e/ou febre não diminuir ou se precisar de tomar o medicamento com mais frequência.

### Condução e utilização de máquinas

Os Exomol 500 não têm influência na capacidade de conduzir e utilizar máquinas.

Consulte o seu médico se estiver com dores nas articulações e precisar tomar analgésicos todos os dias.

### 3. Como tomar Exomol 500

Conforme orientação do médico ou  
Apenas para administração oral e uso a curto  
prazo. Engula os comprimidos com água.

#### Dosagem

##### Adultos, Idosos e Crianças com mais de 16 anos:

Tome 1-2 comprimidos até quatro vezes ao dia, conforme necessário. Não tome mais de 8 comprimidos por dia (24 horas)

##### Crianças de 10 a 15 anos:

1 comprimido a cada 4 horas, conforme necessário, até um máximo de 4 comprimidos em (24 horas.)

##### Deixe pelo menos 4 horas entre as doses.

- Não tome com outros produtos que contêm Exomol 500.
- Não dê a crianças com menos de 10 anos de idade.
- Não exceda a dose estabelecida.
- Se os sintomas persistirem por mais de 3 dias ou piorarem, consulte o seu médico ou farmacêutico.
- Se tomar mais Comprimidos de Paracetamol do que deveria
- Deve procurar-se aconselhamento médico imediato em caso de sobredosagem, mesmo que se sinta bem, devido ao risco de lesão hepática tardia e grave.
- Se você ou outra pessoa engolir vários destes comprimidos ao mesmo tempo, ou se pensa que uma criança engoliu algum destes comprimidos, contacte o seu médico ou farmacêutico ou o serviço de urgência do hospital imediatamente.

##### Caso se tenha esquecido de tomar Exomol 500

Se se esquecer de tomar uma dose, tome-a assim que se lembrar. Se estiver quase na hora da próxima dose, não tome a dose esquecida e continue como antes. Não tome uma dose dupla para compensar um dose esquecida.

#### 4. Possíveis efeitos colaterais

Se sentir algum dos seguintes efeitos graves Pare de tomar este medicamento imediatamente e contacte o seu médico ou farmacêutico:

##### As reações alérgicas graves incluem:

- Dificuldade em respirar

- erupção cutânea e coceira
- inchaço da face e garganta
- nariz a pingar

#### Outros possíveis efeitos colaterais

- Ocasionalmente, o sangue não coagula bem, o que pode resultar em hematomas ou sangramentos fáceis.
- Raramente, uma redução severa no número de glóbulos brancos, o que torna as infecções mais prováveis.

Casos muito raros de reações cutâneas graves foram relatados

#### 5. Como conservar Exomol 500

Armazenar abaixo de 30°C.  
Proteger da luz e da umidade.  
Manter fora da vista e do alcance das crianças.

#### 6. Conteúdo da embalagem e outras informações

##### Qual a composição de Comprimidos de Paracetamol

- A substância ativa é o Paracetamol. Cada comprimido não revestido contém 500 mg de Paracetamol.
- Os outros componentes são: Povidona K30, Silica Coloidal anidra, Glicolato de Amido Sódico, Croscarmelose Sódico, Celulose Microcristalina, Esterato de Magnésio, Talco Purificado.

Exomol 500 estão disponíveis em caixinha de 50 x 10 Comprimidos.

Este folheto foi revisto pela última vez em Dezembro de 2022.

MA Holder:



MS Lab  
92 rue de Lévis  
75017 PARIS FRANCE  
www.mslabfrance.com

[Click Here to Know More](#)