

# MS-AZI 200

## Suspensão de Azitromicina 200 mg/5 ml

**Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informação importante para si.**

- Guarde este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não o passe para os outros. Pode prejudicá-los, mesmo que seus sinais de doença sejam os mesmos que os seus.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico ou farmacêutico. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos colaterais não listados neste folheto. Consulte a seção 4.

### O que tem neste folheto

1. O que é MS-AZI 200 e para que é utilizado
2. O que você precisa saber antes de tomar MS-AZI 200
3. Como tomar MS-AZI 200
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como conservar MS-AZI 200
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

### 1. O que é MS-AZI 200 e para que é utilizado

Este medicamento contém Azitromicina, que faz parte de um grupo de antibióticos chamados macrólidos. É usado para tratar infecções causadas por certas bactérias e outros microrganismos que incluem:

- infecções no peito, garganta ou nasais (como bronquite, pneumonia, amigdalite, dor de garganta (faringite) e sinusite)
  - infecções de ouvido
  - infecções da pele e tecidos moles (como abscesso ou furúnculo)
  - doenças sexualmente transmissíveis causadas por organismos chamados Chlamydia trachomatis ou Neisseria gonorrhoea.
- Deve falar com um médico se não se sentir melhor ou se se sentir pior.

### 2. O que você precisa saber antes de tomar MS-AZI 200

Não tome MS-AZI 200:

- se você/o seu filho é alérgico à Azitromicina ou a qualquer outro antibiótico macrólido como a eritromicina ou claritromicina ou a qualquer um dos componentes mencionados na secção 6.
- Uma reação alérgica pode causar erupção cutânea ou pieira.

### Avisos e Precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar MS-AZI 200 se você/seu filho tem ou teve algum dos seguintes:

- problemas renais
- Problemas de coração
- diabetes
- problemas no fígado: seu médico pode precisar monitorar sua função hepática ou interromper o tratamento
- miastenia gravis (uma condição que faz com que certos músculos fiquem fracos)
- ou se estiver a tomar algum derivado do ergot, como a ergotamina (usada para tratar a enxaqueca), uma vez que estes medicamentos não devem ser tomados em conjunto com MS-AZI 200.

Informe imediatamente o seu médico se sentir o coração a bater no peito ou se tiver um batimento cardíaco anormal, se ficar tonto ou desmaiar ou se sofrer de fraqueza muscular enquanto toma MS-AZI 200.

Se desenvolver diarreia ou fezes moles durante ou após o tratamento, informe o seu médico imediatamente. Não tome nenhum medicamento para tratar a diarreia sem primeiro consultar o seu médico. Se a diarreia continuar, informe o seu médico.

Outros medicamentos e MS-AZI 200

Informe o seu médico ou farmacêutico se você/o seu filho estiver a tomar, tiver tomado recentemente ou se vier a tomar outros medicamentos.

Em particular, MS-AZI 200 pode interagir com os medicamentos listados abaixo:

- ergot ou ergotamina, consulte a seção 'Avisos e precauções'
- varfarina ou qualquer medicamento similar para prevenir coágulos sanguíneos
- ciclosporina (utilizada para suprimir o sistema imunitário para prevenir e tratar a rejeição de um órgão transplantado ou medula óssea)
- antiácidos (para indigestão)
- digoxina (usada para tratar insuficiência cardíaca)
- colchicina (usada para gota e febre familiar do Mediterrâneo)
- terfenadina (para febre do feno ou alergia cutânea)
- hidroxicloquina ou cloroquina (utilizadas para tratar doenças como a artrite reumatóide, ou para tratar ou prevenir a malária): Tomar estes medicamentos ao mesmo tempo que a Azitromicina pode aumentar a probabilidade de ter efeitos secundários que afetam o coração.

### MS-AZI 200 com comida e bebida

#### Consulte a seção 3.

Gravidez, amamentação e fertilidade

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Condução e utilização de máquinas

Não se espera que MS-AZI 200 afete a sua capacidade de conduzir ou utilizar máquinas.

### 3. Como tomar MS-AZI 200

Sempre tome ou administre este medicamento exatamente como seu médico lhe disse.

Consulte o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

A suspensão MS-AZI 200 é geralmente usada para crianças com menos de 7 anos (45 kg). Também pode ser usado em adultos e crianças mais velhas que tenham dificuldade em engolir cápsulas.

A suspensão MS-AZI 200 não é afetada por alimentos ou bebidas.

Crianças com menos de 45 kg

A dose recomendada em crianças é de 10 mg por cada kg de peso corporal, administrada em dose única diária durante 3 dias.

Adultos e crianças acima de 45 kg

A dose recomendada em adultos e crianças com mais de 7 anos (45 kg) é de 500 mg em dose única, durante 3 dias. Para algumas doenças, como a clamídia, a dose recomendada é de 1 g por dia em dose única. Para gonorreia, a dose recomendada é de 1 g ou 2 g de Azitromicina em combinação com 250 ou 500 mg de ceftriaxona.

Deve informar o seu médico se tiver/o seu filho tiver problemas renais ou hepáticos, uma vez que o seu médico poderá necessitar de alterar a dose normal.

Os médicos às vezes prescrevem doses diferentes da dose recomendada. O rótulo da embalagem informará qual dose você/seu filho deve tomar. Se ainda não tiver certeza, pergunte ao seu médico ou farmacêutico. Continue sempre com o tratamento, mesmo que você/seu filho se sinta melhor. Se a sua infecção piorar ou você não começar a se sentir melhor dentro de alguns dias ou uma nova infecção se desenvolver, volte e consulte o seu médico.

Como dar MS-AZI 200 Suspensão em crianças com menos de 3 anos de idade  
Se o seu filho tiver menos de três anos de idade ou pesar até 15 kg de peso corporal, deve medir a dose o mais claramente possível, utilizando a seringa para administração oral fornecida.

#### A. Instruções para a seringa

##### Enchendo a seringa com remédio

1. Agite o frasco antes de usar e retire a tampa.
  2. Verifique o rótulo de dispensa anexado pelo seu farmacêutico para ver a quantidade de medicamento que precisa ser tomada.
  3. Enquanto a garrafa está sobre uma superfície firme e plana, segure-a com uma mão. Com a outra mão insira a ponta da seringa no frasco. Puxe lentamente o êmbolo da seringa para que a borda superior fique nivelada com a marca de graduação correspondente à quantidade em mililitros (ml) prescrita pelo seu médico.
  4. Se grandes bolhas puderem ser vistas na seringa, empurre lentamente o êmbolo de volta para dentro da seringa. Isso forçará o medicamento de volta ao frasco. Repita o passo 6 novamente.
  5. Segure a seringa e o frasco com firmeza. Vire o frasco na vertical, com a seringa ainda no lugar.
  6. Retire a seringa do frasco.
- Dar o medicamento usando a seringa
1. Certifique-se de que seu filho esteja apoiado na posição vertical.
  2. Coloque a ponta da seringa cuidadosamente na boca do seu filho. Aponte a ponta da seringa para o interior da bochecha do seu filho.
  3. Empurre lentamente o êmbolo da seringa: Não o esguiche rapidamente. O medicamento escorrerá para a boca do seu filho.
  4. Dê algum tempo ao seu filho para engolir o medicamento.
  5. Recoloque a tampa à prova de crianças na garrafa. Lave a seringa conforme as instruções abaixo.
  6. Quando doses diárias inferiores a 5ml forem administradas por três dias, alguma suspensão permanecerá no frasco. Esta suspensão restante deve ser descartada.

Limpeza e armazenamento da seringa

1. Puxe o êmbolo para fora da seringa e lave ambas as partes segurando em água morna corrente ou mergulhando em solução esterilizante usada para mamadeiras de bebê, etc.
2. Seque as duas partes. Empurre o êmbolo de volta para a seringa. Mantenha-o em um local limpo e seguro com o medicamento. Depois de ter dado ao seu filho a última dose do medicamento, embrulhe a seringa numa folha de jornal e coloque-a no caixote do lixo.

## MS-AZI 200 Suspensão em crianças entre 3 e 14 anos Como administrar

Peso corporal e idade	Dose e duração
15-25 kg de peso corporal (3-7 anos): (Entre 2½ e 4 anos)	5 ml (200 mg), administrados em 1 colher de chá de 5 ml, uma vez por dia durante 3 dias.
26-35 kg de peso corporal (8-11 anos): (entre 4 e 5½ anos)	7,5 ml (300 mg), administrados em 1 colher de chá de 7,5 ml, uma vez por dia durante 3 dias.
36-45 kg de peso corporal (12-14 anos): (entre 5½ e 7 anos)	10 ml (400 mg), administrados em 1 colher de chá de 10 ml, uma vez por dia durante 3 dias.

Se você/seu filho tomar mais MS-AZI 200 do que deveria

Se você/seu filho tomar muito MS-AZI 200, eles podem se sentir mal. Informe o seu médico ou contacte imediatamente o serviço de urgências do hospital mais próximo. Leve qualquer medicamento restante com você.

Caso se tenha esquecido de tomar ou administrar MS-AZI 200

Se você esquecer de tomar MS-AZI 200, tome-o assim que puder. Tome a sua próxima dose na hora certa. Não tome uma dose dupla para compensar uma dose esquecida.

Se você parar de tomar MS-AZI 200

Se você/seu filho parar de tomar MS-AZI 200 muito cedo, a infecção pode retornar. Tome MS-AZI 200 durante todo o tratamento, mesmo quando você/seu filho começar a se sentir melhor.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

### 4. Possíveis efeitos colaterais

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos colaterais, embora nem todos os apresentem.

**Informe o seu médico imediatamente se sentir algum dos seguintes sintomas após tomar este medicamento, pois os sintomas podem ser graves.**

- pieira súbita, dificuldade em respirar, inchaço das pálpebras, face ou lábios, erupção cutânea ou comichão (especialmente afetando todo o corpo)
- diarreia grave ou prolongada, que pode conter sangue ou muco, durante ou após o tratamento com MS-AZI 200, pois pode ser um sinal de inflamação intestinal grave
- erupção cutânea grave causando vermelhidão e descamação
- batimentos cardíacos rápidos ou irregulares
- pressão sanguínea baixa
- Reações cutâneas graves: - bolhas na pele, boca, olhos e genitais (Síndrome de Stevens-Johnson (SSJ))
- bolhas na pele, reação cutânea grave (necrose epidérmica tóxica (NET))
- erupção cutânea acompanhada de outros sintomas, como febre, glândulas inchadas e aumento de eosinófilos (um tipo de glóbulo branco). Uma erupção cutânea aparece como pequenas protuberâncias vermelhas com coceira (Reação à Droga com Eosinofilia e Sintomas Sistêmicos (DRESS))
- erupção cutânea caracterizada pelo aparecimento rápido de áreas de pele vermelha cravejadas de pequenas pústulas (pequenas bolhas cheias de líquido branco/amarelo) (Pustulose Exantemática Generalizada Aguda (PEGA)).

Pare de tomar Azitromicina se desenvolver estes sintomas cutâneos e contacte o seu médico ou procure assistência médica imediatamente.

Os efeitos colaterais mais comuns que ocorrem ao tomar MS-AZI 200 estão listados abaixo. Estes podem desaparecer durante o tratamento à medida que o seu corpo se ajusta ao medicamento. Informe o seu médico se algum destes efeitos secundários continuar a incomodá-lo:

**Muito frequentes: podem afetar mais de 1 em cada 10 pessoas**

- cólicas estomacais, mal-estar, diarreia, gases.

**Frequentes: podem afetar até 1 em cada 10 pessoas**

- tontura, dor de cabeça
- dormência ou formiguelo
- estar doente, indigestão
- perda de apetite, alteração do paladar
- distúrbios visuais, surdez
- erupção cutânea e/ou coceira
- dor nas articulações
- baixo número de linfócitos (um tipo de glóbulo branco), maior número de eosinófilos (tipo de glóbulo branco)
- baixo teor de bicarbonato no sangue
- cansaço ou fraqueza.

**Pouco frequentes: podem afetar até 1 em 100 pessoas**

- infecções fúngicas da boca e vagina (aftas)
- baixo número de leucócitos (um tipo de glóbulo branco), baixo número de neutrófilos (um tipo de glóbulo branco)
- reações alérgicas de várias gravidades
- pele mais sensível à luz solar do que o normal
- sentindo nervoso
- sensação de toque ou sensação reduzida (hipoestesia)
- sonolência ou insônia (insônia)
- audição deficiente ou zumbido nos ouvidos

- palpitações cardíacas, dor no peito
- prisão de ventre, dor de estômago associada a diarreia e febre
- inflamação do fígado (hepatite), alterações nas enzimas hepáticas.
- perda geral de força
- inchaço
- desconforto geral
- valores anormais de exames laboratoriais (por exemplo, exames de sangue ou fígado).

**Raros: podem afetar até 1 em 1.000 pessoas**

- agitação
  - vertigem
  - alterações na função hepática
- Desconhecido: a frequência não pode ser estimada a partir dos dados disponíveis**
- convulsões ou desmaios
  - agressão ou ansiedade
  - sensação de hiperatividade
  - fraqueza muscular localizada
  - perda do olfato ou olfato alterado, perda do paladar
  - descoloração da língua
  - inflamação do pâncreas (pancreatite)
  - inflamação do rim ou insuficiência renal
  - amarelecimento da pele ou dos olhos (icterícia) ou insuficiência hepática (raramente com risco de vida)
  - hematomas ou sangramento prolongado após lesão
  - eletrocardiograma (ECG) anormal
  - redução dos glóbulos vermelhos que podem tornar a pele pálida e causar fraqueza ou falta de ar.

### Relato de efeitos colaterais

Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico ou farmacêutico. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos colaterais não listados neste folheto.

### 5. Como conservar MS-AZI 200

Armazenar abaixo de 30°C. Proteger da luz. Manter fora da vista e do alcance das crianças. Qualquer medicamento não utilizado deve ser descartado após 5 dias.

### 6. Conteúdo da embalagem e outras informações

#### Qual a composição de MS-AZI 200

A substância ativa é a Azitromicina. Cada 5 ml (após reconstituição) contém: Azitromicina (Como Dihidratado) eq. ao Azitromicina 200 mg.

Os outros componentes são: Kyron T-135, Açúcar refinado, Metilparabeno de sódio, Propil parabeno de sódio, Sacarina sódio, Silica Coloidal Anidra, Goma xantana, Pó seco de laranja, Aspartame and Mentol.

MS-AZI 200 Suspensão está disponível em caixinha contendo 30 ml, Frasco de vidro contendo pó de Azitromicina, com seringa de dosagem oral e 20 ml de WFI.

Este folheto foi revisto pela última vez em Dezembro de 2022.

MA Holder:

 MS Lab  
92 rue de Lévis  
75017 PARIS FRANCE  
www.mslabfrance.com

[Click Here to Know More](#)