

MS-Brom ADULTO

Cloridrato de Bromexina Xarope 8 mg/5 ml

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informação importante para si.

- Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Se não se sentir melhor ou se piorar após 7 dias, tem de consultar um médico.

O que têm neste folheto:

1. O que é MS-Brom ADULTO e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar MS-Brom ADULTO
3. Como tomar MS-Brom ADULTO
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como conservar MS-Brom ADULTO
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é MS-Brom ADULTO e para que é utilizado

MS-Brom ADULTO xarope está indicado como adjuvante mucolítico do tratamento antibacteriano das infeções respiratórias em presença de hipersecreção brônquica. MS-Brom ADULTO reduz a viscosidade das secreções brônquicas. O muco torna-se mais fluido. MS-Brom ADULTO tem um efeito estimulador sobre a mucosa brônquica para produzir secreções brônquicas mais fluidas. Além disso, fica facilitada a drenagem do material tensoativo dos alvéolos pulmonares e dos brônquios. Juntamente com a ativação do epitélio ciliar da mucosa brônquica, estes mecanismos mantêm e melhoram a capacidade de autopurificação das vias aéreas. Facilita e acelera a eliminação do muco dos alvéolos pulmonares com a sua ação fluidificante e expetorante. Se não se sentir melhor ou se piorar após 7 dias, tem de consultar um médico.

2. O que precisa de saber antes de tomar MS-Brom ADULTO

Não tome MS-Brom ADULTO:

- se tem alergia (hipersensibilidade) à bromexina ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6);
- se sofre de úlcera gastroduodenal;
- se sofre de doenças hereditárias raras em que haja incompatibilidade com um

dos excipientes do medicamento (ver "MS-Brom ADULTO contém maltitol líquido").

Advertências e precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar MS-Brom ADULTO

- Se tem tendência para sofrer de problemas gástricos, se sofre de doença hepática ou de insuficiência renal ou se tem asma, não tome MS-Brom ADULTO sem consultar previamente o seu médico;
- Se notar alterações na pele ou nas mucosas durante o tratamento com MS-Brom ADULTO, que apareçam simultaneamente com outros sintomas como febre, dores no corpo, rinite, tosse e garganta inflamada, contacte imediatamente o seu médico e, como precaução, suspen da a toma deste medicamento.

Outros medicamentos e MS-Brom ADULTO

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, ou tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.

Não associe MS-Brom ADULTO com medicamentos antitússicos nem com secantes de secreções, pois possuem um efeito contrário ao pretendido.

Gravidez, amamentação e fertilidade

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Se está grávida deve evitar tomar MS-Brom ADULTO, pois existem poucos dados disponíveis sobre o uso de bromexina durante a gravidez.

Desconhece-se se a bromexina é excretada no leite materno, consequentemente MS-Brom ADULTO não deve ser tomado durante a amamentação.

Não existem dados que sugiram qualquer efeito do MS-Brom ADULTO na fertilidade. Contudo, não foi estudado o efeito de na fertilidade humana.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Não foi estudado o efeito de MS-Brom ADULTO na capacidade de conduzir ou utilizar máquinas.

MS-Brom ADULTO contém maltitol líquido.

Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.

MS-Brom ADULTO pode ter um efeito

AHM071V00

laxante moderado.

3. Como tomar MS-Brom ADULTO

Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Administração via oral.

A dose recomendada é

- Crianças dos 6 aos 12 anos:
2,5 ml, 3 vezes ao dia.
(5 ml \approx 1 colher de chá)
- Adultos e crianças com mais de 12 anos:
5 ml, 3 vezes do dia.

No início do tratamento, poderá ser necessário aumentar a dose diária total, até um máximo de 48 mg, nos adultos. O xarope é isento de açúcar e por isso adequado para diabéticos.

MS-Brom ADULTO provoca uma diminuição da viscosidade do muco e o aumento da remoção do mesmo, sendo esperado um aumento da expectoração e da tosse, durante o tratamento com MS-Brom ADULTO.

Se tomar mais MS-Brom ADULTO do que deveria

Não são conhecidos casos de sobredosagem com MS-Brom ADULTO. No entanto, caso acidentalmente tome mais MS-Brom ADULTO do que o recomendado e venha a sofrer de alguns dos efeitos adversos de MS-Brom ADULTO, consulte imediatamente o seu médico. Pode ser necessário fazer tratamento para aliviar os sintomas da sobredosagem.

Caso se tenha esquecido de tomar MS-Brom ADULTO

Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Possíveis efeitos colaterais

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

MS-Brom ADULTO é geralmente bem tolerado. No entanto, embora pouco frequentes, podem ocorrer: náuseas, vômitos, diarreia e dor na parte superior do abdómen.

Mais raramente podem ainda ocorrer reações anafiláticas, incluindo choque anafilático, angioedema, broncoespasmo, eritema cutâneo, urticária, prurido e outro tipo de hipersensibilidade.

se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.

5. Como conservar MS-Brom ADULTO

Conservar abaixo de 30°C em local seco. Proteger da luz.

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

Agitar bem antes de usar.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior, após "VAL.". O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Após a primeira abertura do frasco, MS-Brom ADULTO poderá ser usado até um máximo de 12 meses.

Não utilize este medicamento se verificar que o xarope se tornou turvo.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de MS-Brom ADULTO

- A substância ativa é Cloridrato de Bromexina.
Cada 5 ml de xarope contém, 8 mg de Cloridrato de Bromexina.
- Os outros componentes são Metilparabeno de sódio, propil parabeno de sódio, benzoato de sódio, sacarose, glicose líquida, propileno gliol, sorbitol, sódio sacarina, Pôr do Sol Amarelo FCF, Sabor laranja doce, mentol, monohidrato de ácido cítrico e citrato de sódio.

MS-Brom ADULTO esta disponível em frasco de vidro de 200 ml.

Este folheto foi revisto pela última vez em Dezembro de 2022.

MA Holder:



MS Lab
92 rue de Lévis
75017 PARIS FRANCE
www.mslabfrance.com

[Click Here to Know More](#)