

MS-Brom CRIANÇA

Cloridrato de Bromexina Xarope 4 mg/5 ml

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informação importante para si.

- Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico.
- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou far macêutico.
- Se não se sentir melhor ou se piorar após 7 dias, tem de consultar um médico.

O que têm neste folheto

1. O que é MS-Brom CRIANÇA e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar MS-Brom CRIANÇA
3. Como tomar MS-Brom CRIANÇA
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como conservar MS-Brom CRIANÇA
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é MS-Brom CRIANÇA e para que é utilizado

MS-Brom CRIANÇA xarope está indicado como adjuvante mucolítico do tratamento antibacteriano das infeções respiratórias em presença de hipersecreção brônquica. MS-Brom CRIANÇA reduz a viscosidade das secreções brônquicas. O muco torna-se mais fluido. MS-Brom CRIANÇA tem um efeito estimulador sobre a mucosa brônquica para produzir secreções brônquicas mais fluidas. Além disso, fica facilitada a drenagem do material tensoativo dos alvéolos pulmonares e dos brônquios. Juntamente com a ativação do epitélio ciliar da mucosa brônquica, estes mecanismos mantêm e melhoram a capacidade de autopurificação das vias aéreas. Facilita e acelera a eliminação do muco dos alvéolos pulmonares com a sua ação fluidificante e expetorante. Se não se sentir melhor ou se piorar após 7 dias, tem de consultar um médico.

2. O que precisa de saber antes de tomar MS-Brom CRIANÇA

Não tome MS-Brom CRIANÇA:

- se tem alergia (hipersensibilidade) à bromexina ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6);
- se sofre de úlcera gastroduodenal;
- se sofre de doenças hereditárias raras em que haja incompatibilidade com um dos excipientes do medicamento (ver "MS-Brom CRIANÇA contém maltitol líquido").

Advertências e precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar MS-Brom CRIANÇA

- Se tem tendência para sofrer de problemas gástricos, se sofre de doença hepática ou de insuficiência renal ou se tem asma, não tome MS-Brom CRIANÇA sem consultar previamente o seu médico;
- Se notar alterações na pele ou nas mucosas durante o tratamento com MS-Brom CRIANÇA, que apareçam simultaneamente com outros sintomas como febre, dores no corpo, rinite, tosse e garganta inflamada, contacte imediatamente o seu médico e, como precaução, suspen da a toma deste medicamento.

Outros medicamentos e MS-Brom CRIANÇA

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, ou tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros medicamentos.

Não associe MS-Brom CRIANÇA com medicamentos antitússicos nem com secantes de secreções, pois possuem um efeito contrário ao pretendido.

Gravidez, amamentação e fertilidade

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Se está grávida deve evitar tomar MS-Brom CRIANÇA, pois existem poucos dados disponíveis sobre o uso de bromexina durante a gravidez.

Desconhece-se se a bromexina é excretada no leite materno, consequentemente MS-Brom CRIANÇA não deve ser tomado durante a amamentação.

Não existem dados que sugiram qualquer efeito do MS-Brom CRIANÇA na fertilidade. Contudo, não foi estudado o efeito de na fertilidade humana.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Não foi estudado o efeito de MS-Brom CRIANÇA na capacidade de conduzir ou utilizar máquinas.

MS-Brom CRIANÇA contém maltitol líquido.

Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento. MS-Brom CRIANÇA pode ter um efeito laxante moderado.

3. Como tomar MS-Brom CRIANÇA

Tome este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico

ou farmacêutico se tiver dúvidas.
Administração via oral.

MS-Brom CRIANÇA é administrado por via oral. A embalagem contém uma colher de medida para facilitar as medições e 5 ml de MS-Brom CRIANÇA, que contém 4 mg Cloridrato de Bromexina, correspondem aproximadamente a 1 colher de chá.

A dose recomendada é:

- Adultos e CRIANÇAS com mais de 12 anos: 10 ml (2 colheres de medida completa), 3 vezes ao dia, até um máximo de 60 ml (equivalente a 48 mg de Bromexina) ao dia.
- CRIANÇAS dos 6 aos 12 anos: 5 ml (1 colher de medida completa), 3 vezes ao dia, até um máximo de 20 ml (equivalente a 16 mg de Bromexina) ao dia.
- CRIANÇAS dos 2 aos 6 anos: 2,5 ml (1 colher de medida aferida até à marca de ½), 3 vezes ao dia, até um máximo de 10 ml (equivalente a 8 mg de Bromexina) ao dia.

No início do tratamento, poderá ser necessário aumentar a dose diária total, até um máximo de 48 mg, nos adultos.

MS-Brom CRIANÇA provoca uma diminuição da viscosidade do muco e o aumento da sua eliminação. É de esperar, portanto, um aumento da expectoração e da tosse, durante o tratamento com este medicamento. Contudo, em caso de agravamento ou persistência dos sintomas após 7 dias, consulte o seu médico.

Se tomar mais MS-Brom CRIANÇA do que deveria

Não são conhecidos casos de sobredosagem com MS-Brom CRIANÇA. No entanto, caso acidentalmente tome mais MS-Brom CRIANÇA do que o recomendado e venha a sofrer de alguns dos efeitos adversos de MS-Brom CRIANÇA, consulte imediatamente o seu médico. Pode ser necessário fazer tratamento para aliviar os sintomas da sobredosagem.

Caso se tenha esquecido de tomar MS-Brom CRIANÇA

Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Possíveis efeitos colaterais

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos secundários, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

MS-Brom CRIANÇA é geralmente bem tolerado. No entanto, embora pouco

frequentes, podem ocorrer: náuseas, vômitos, diarreia e dor na parte superior do abdómen.

Mais raramente podem ainda ocorrer reações anafiláticas, incluindo choque anafilático, angioedema, broncospasmo, eritema cutâneo, urticária, prurido e outro tipo de hipersensibilidade.

se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.

5. Como conservar MS-Brom CRIANÇA

Conservar abaixo de 30°C em local seco. Proteger da luz.

Manter fora da vista e do alcance das Crianças.

Agitar bem antes de usar.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior, após "VAL.". O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Após a primeira abertura do frasco, MS-Brom CRIANÇA poderá ser usado até um máximo de 12 meses.

Não utilize este medicamento se verificar que o xarope se tornou turvo.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de MS-Brom CRIANÇA

- A substância ativa é Cloridrato de Bromexina.
- Cada 5 ml de xarope contém 4 mg de Cloridrato de Bromexina.
- Os outros componentes são Metilparabeno de sódio, propil parabeno de sódio, benzoato de sódio sacarose, glicose líquida, propileno glicol, sorbitol, sódio sacarina, Sabor laranja doce, mentol, monohidrato de ácido cítrico e citrato de sódio.

MS-Brom CRIANÇA esta disponível em frasco de vidro de 200 ml.

Este folheto foi revisto pela última vez em Dezembro de 2022.

MA Holder:

 MS Lab
92 rue de Lévis
75017 PARIS FRANCE
www.mslabfrance.com

[Click Here to Know More](#)