

Msvit-C

Ácido Ascórbico Oral Solução 100 mg/5 ml

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento, pois contém informação importante para si.

- Guarde este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não o passe para os outros. Pode prejudicá-los mesmo que seus sinais de doença sejam os mesmos que os seus.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico, farmacêutico ou enfermeiro. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos colaterais não listados neste folheto.

O que tem neste folheto

1. O que é a Msvit-C e para que é utilizados
2. O que precisa saber antes de tomar a Msvit-C
3. Como tomar Msvit-C
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como conservar Msvit-C
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é a Msvit-C e para que é utilizados

O Ácido Ascórbico (Vitamina C) ocorre naturalmente em alimentos como frutas cítricas, tomates, batatas e vegetais folhosos. A Vitamina C desempenha um papel importante no corpo. É necessário manter a saúde da pele, cartilagem, dentes, ossos e vasos sanguíneos. A Vitamina C também ajuda o corpo a absorver o ferro, que é necessário para a produção de glóbulos vermelhos. Também é usado para proteger as células do seu corpo contra danos. É conhecido como antioxidante. A Msvit-C é usada para tratar e prevenir a deficiência de Vitamina C, particularmente usada para prevenir ou tratar baixos níveis de Vitamina C em pessoas que não recebem Vitamina suficiente de suas dietas.

A maioria das pessoas que comem uma dieta normal não precisa de Ácido Ascórbico extra. Baixos níveis de Vitamina C podem resultar em uma condição chamada escorbuto. O escorbuto pode causar sintomas como erupção cutânea, fraqueza muscular, dor nas articulações, cansaço ou perda de dentes.

2. O que precisa saber antes de tomar a Msvit-C

Informe seus profissionais de saúde sobre todas as suas condições médicas, alergias e todos os medicamentos que você usa. Você não deve usar Ácido Ascórbico se já teve uma reação alérgica a um suplemento de Vitamina C.

Pergunte a um médico ou farmacêutico sobre o uso de Ácido Ascórbico se você tiver:

doença renal ou histórico de cálculos renais;
distúrbio hereditário de sobrecarga de ferro (hematocromatose); ou
se você fuma (fumar pode tornar o Ácido Ascórbico menos eficaz).

Interação com outros medicamentos

Outros medicamentos podem interagir com o Ácido Ascórbico, incluindo medicamentos prescritos e vendidos sem receita, vitaminas e produtos à base de plantas. Informe a cada um de seus profissionais de saúde sobre todos os medicamentos que você usa agora e quaisquer medicamentos que você comece ou pare de usar.

Avisos e Precauções

Não pare de usar Ácido Ascórbico de repente após o uso prolongado em altas doses, ou você pode ter deficiência "condicional" de Vitamina C. Os sintomas incluem sangramento nas gengivas, sensação de muito cansaço e manchas vermelhas ou azuis ao redor dos folículos pilosos. Siga as instruções do seu médico sobre a redução gradual da sua dose. A deficiência condicional de Vitamina C pode ser difícil de

corrigir sem supervisão médica.

Gravidez ou amamentação

As suas necessidades de dose podem ser diferentes durante a gravidez ou enquanto estiver a amamentar um bebé. Não use Ácido Ascórbico sem o conselho do seu médico em ambos os casos.

3. Como tomar Msvit-C

Use exatamente como indicado no rótulo ou conforme prescrito pelo seu médico. Não use em quantidades maiores ou menores ou por mais tempo do que o recomendado. A ingestão dietética recomendada de Ácido Ascórbico (Vitamina C) aumenta com a idade.

Crianças:

1 a 2 anos 2,5 ml (1/2 colher de chá.)
3 a 6 anos 5 ml (1 colher de chá.)
7 a 12 anos 10 ml (2 colheres de chá.)
Ou Conforme indicado pelo médico.

Beba bastante líquido enquanto estiver tomando Ácido Ascórbico.

Meça o medicamento líquido com uma colher doseadora especial ou copo de medicamento. Se você não tiver um dispositivo de medição de dose, peça um ao seu farmacêutico.

Caso se tenha esquecido de tomar Msvit-C Tome a dose esquecida assim que se lembrar. Pule a dose esquecida se estiver quase na hora da próxima dose programada. Não tome medicamento extra para compensar uma dose esquecida. Se tomar mais Msvit-C do que deveria Procure atendimento médico de emergência.

4. Possíveis efeitos colaterais

Obtenha ajuda médica de emergência se tiver algum destes sinais de reação alérgica: urticária; respiração difícil; inchaço da face, lábios, língua ou garganta.

Pare de usar Ácido Ascórbico e chame seu médico imediatamente se tiver: dor nas articulações, fraqueza ou sensação de cansaço, perda de peso, dor de estômago; calafrios, febre, aumento da vontade de urinar, micção dolorosa ou difícil; ou dor intensa na lateral ou na parte inferior das

costas, sangue na urina.

Os efeitos colaterais comuns podem incluir: azia, dor de estômago; ou náuseas, diarreia, cólicas estomacais.

Relatando efeitos colaterais

Esta não é uma lista completa de efeitos colaterais e outros podem ocorrer. Ligue para o seu médico para aconselhamento médico sobre os efeitos colaterais.

5. Como conservar Msvit-C

Armazenar abaixo de 30°C em local seco. Proteger da luz. Manter fora da vista e do alcance das crianças. Agitar bem antes de usar.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

O que contém a Msvit-C

A substância ativa é o Ácido Ascórbico. Cada 5 ml contem 100 mg de Acido Ascórbico.

Os outros componentes são: Metil parabeno de sódio, propil parabeno de sódio, benzoato de sódio, Sacarose, sorbitol, glicerina, neotame, sacarina de sódio, bronopol, Monohidrato de ácido cítrico, citrato de sódio.

Msvit-C está disponível em frasco de vidro de 100 ml.

Este folheto foi revisado pela última vez em Dezembro de 2022.

MA Holder:



MS Lab
92 rue de Lévis
75017 PARIS FRANCE
www.mslabfrance.com

[Click Here to Know More](#)