

# Mebendazol

Mebendazol Suspensão Oral 100 mg/5 ml

## Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento.

Guarde este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.

Se ainda tiver dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.

Esse remédio foi receitado para você. Não o transmita a outros. Pode prejudicá-los, mesmo que os sintomas sejam os mesmos que os seus.

Se tiver efeitos secundários que se tornem graves ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico

## O que tem neste folheto

1. O que é Mebendazol Suspensão Oral e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Mebendazol Suspensão Oral
3. Como tomar Mebendazol Suspensão Oral
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como conservar Mebendazol Suspensão Oral
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

## 1. O que é Mebendazol Suspensão Oral e para que é utilizado

O nome do seu medicamento é Mebendazol Suspensão Oral. Contém um medicamento chamado Mebendazol. Faz parte de um grupo de medicamentos denominados "anti-helmínticos".

Mebendazol Suspensão Oral é usado para tratar infecções por vermes do intestino, tais como:

- lombrigas (oxiúros)
- outras infecções por vermes comuns (como whipworm, lombriga, ancilostomíase)

Este medicamento é para uso em adultos e crianças com idade superior a 2 anos.

Você ou seu filho foram aconselhados a tomar Mebendazol Suspensão Oral porque você tem uma infecção por vermes. Os vermes podem infectar qualquer pessoa. Isso não significa necessariamente que sua higiene é ruim.

Para impedir que você e sua família infectem outras pessoas ou se reinfectem, siga os conselhos abaixo por pelo menos seis semanas:

- Manter as unhas curtas
- Desencorajar roer unhas ou chupar dedos
- Use pijamas ou roupas íntimas na cama
- Pela manhã, lave bem o bumbum
- Use uma toalha separada para cada pessoa da casa
- Troque de roupa regularmente
- Lave e passe a roupa de cama regularmente
- Lavar bem as mãos e unhas após usar o banheiro e antes das refeições

## 2. O que precisa de saber antes de tomar Mebendazol Suspensão Oral

Não use Mebendazol Suspensão Oral se:

- Você é alérgico a qualquer coisa do Mebendazol Suspensão Oral (listado na seção 6 abaixo)
- Seu filho tem menos de 2 anos

Não use este medicamento se alguma das situações acima se aplicar a você. Se tiver dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar Mebendazol Suspensão Oral.

## Tomando outros medicamentos

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos. Isso inclui medicamentos que você compra sem receita médica, medicamentos fitoterápicos, suplementos dietéticos ou vitaminas. Em particular, informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar:

- Metronidazol - para certas infecções
- Cimetidina - para excesso de acidez estomacal

Fale com o seu médico antes de utilizar Mebendazol Suspensão Oral se estiver a tomar algum destes medicamentos.

## Gravidez e amamentação

- Não tome Mebendazol Suspensão Oral se estiver grávida, pensa estar grávida ou pode engravidar
- Consulte o seu médico ou farmacêutico se estiver a amamentar

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento se estiver grávida ou a amamentar.

## Condução e utilização de máquinas

Não é provável que este medicamento afete a sua capacidade de conduzir ou utilizar quaisquer ferramentas ou máquinas.

## Informações importantes sobre alguns componentes de Mebendazol Suspensão Oral

Mebendazol Suspensão Oral contém Sacarose. Se o seu médico lhe disse que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.

## 3. Como tomar Mebendazol Suspensão Oral

Sempre use Mebendazol Suspensão Oral exatamente como indicado pelo seu médico. Deve consultar o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Usando este medicamento

- Tome este medicamento por via oral
- A dose dependerá de qual tipo de verme você tem
- Sempre agite bem o frasco antes de usar
- Use o copo de 5 ml da embalagem para medir a dose
- Sempre supervisione uma criança se ela estiver tomando este medicamento
- Você não precisa usar um laxante ou mudar sua dieta

## Quanto você deve tomar

### Adultos e crianças com mais de 2 anos

#### **Para threadworms (pinworms):**

- um copo medidor de 5 ml (ou colher) de suspensão

Uma dose única de Mebendazol Suspensão Oral matará os vermes. O seu médico pode dizer-lhe para tomar uma segunda dose após 2 semanas em caso de reinfeção.

#### **Para outras infecções comuns por vermes:**

- um copo medidor de 5 ml (ou colher) de suspensão duas vezes ao dia (manhã e noite) por três dias consecutivos ou conforme indicado pelo seu médico

#### **Se tomar mais Mebendazol Suspensão Oral do que deveria**

Se tomar mais Mebendazol Suspensão Oral do que deveria, fale com um médico ou dirija-se imediatamente à urgência do hospital mais próximo.

Caso se tenha esquecido de tomar Mebendazol Suspensão Oral

- Não tome a dose esquecida
- Tome a sua próxima dose à hora habitual e depois continue a tomar o medicamento conforme indicado pelo seu médico
- Não tome uma dose dupla para compensar uma dose esquecida

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste produto, fale com o seu médico ou farmacêutico.

#### **4. Possíveis efeitos colaterais**

Como todos os medicamentos, Mebendazol Suspensão Oral pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

**Pare de usar Mebendazol Suspensão Oral e informe o seu médico imediatamente se notar ou suspeitar dos seguintes efeitos colaterais graves. Você pode precisar de tratamento médico urgente.**

- Inchaço súbito do rosto ou garganta. Urticária (também conhecida como urticária ou urticária), irritação grave, vermelhidão ou formação de bolhas na pele. Estes podem ser sinais de uma reação alérgica grave
- Formação de bolhas na pele, boca, olhos e órgãos genitais
- Ataques (convulsões)

**Informe o seu médico ou farmacêutico se notar algum dos seguintes efeitos secundários:**

Comum (afeta menos de 1 em cada 10 pessoas)

- Dor de estômago

**Pouco frequentes (afectam menos de 1 em 100 pessoas)**

- Irritação na pele
- Desconforto no estômago
- Diarréia
- Vento

**Muito raros (afeta menos de 1 em 10.000 pessoas)**

- Inflamação do fígado
- Alterações nas enzimas hepáticas (demonstradas em exames de sangue)
- Redução dos glóbulos brancos (demonstrada nas análises ao sangue). Você pode ter mais infecções

- Perda de cabelo incomum

Se tiver efeitos secundários que se tornem graves ou se detectar quaisquer outros efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

#### **5. Como conservar Mebendazol Suspensão Oral**

Armazenar abaixo de 30°C em local seco. Proteger da luz.

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

Agitar bem antes de usar.

Não utilize Mebendazol Suspensão Oral após o prazo de validade impresso no rótulo. A data de validade refere-se ao último dia desse mês.

Não há condições especiais de armazenamento.

Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. Essas medidas ajudarão a proteger o meio ambiente. Devolva qualquer sobra de Mebendazol Suspensão Oral ao seu farmacêutico.

#### **6. Conteúdo da embalagem e outras informações**

**Qual é a composição de Mebendazol Suspensão Oral**

- A substância ativa é o Mebendazol.

- Cada 5 ml contém 100 mg de Mebendazol.

- Os outros componentes são Sacarose, Sódio metil parabeno, Sódio propil parabeno, Benzoato de sódio, Ácido cítrico monohidratado, citrato de sódio, propilenoglicol, glicerina, Goma xantana, Sódio carboximetilcelulose, EDTA dissódico e citrato de sódio.

Mebendazol Suspensão Oral está disponível em frasco de vidro de 30 ml.

Este folheto foi revisado pela última vez em Dezembro de 2022.

MA Holder:



MS Lab  
92 rue de Lévis  
75017 PARIS FRANCE  
www.msllabfrance.com

[Click Here to Know More](#)