

Metronidazol

Suspensão Oral de Metronidazol 125 mg/5 ml

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informação importante para si.

- Guarde este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não o passe para os outros. Pode prejudicá-los, mesmo que seus sinais de doença sejam os mesmos que os seus.
- Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.

O que tem neste folheto

1. O que é Metronidazol Suspensão e para que e utilizados
2. O que precisa de saber antes de tomar Metronidazol Suspensão
3. Como tomar Metronidazol Suspensão
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como conservar Metronidazol Suspensão
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Metronidazol Suspensão e para que e utilizados

O nome do seu medicamento é Metronidazol Suspensão. Contém Benzoato de Metronidazol. Este pertence a um grupo de medicamentos chamados antibacterianos.

Metronidazol pode ser usado para:

Adultos e crianças acima de 1 ano

- prevenir infecções após uma operação
- tratar infecções, incluindo infecções do sangue, cérebro, pulmões, ossos, revestimento do abdómen, pélvis e infecções após o parto ou à volta da área onde foi operada
- tratamento da tricomoníase. Esta é uma infecção sexualmente transmissível, em homens e mulheres
- tratamento da amebíase - uma infecção do intestino ou do fígado causada por um parasita
- tratamento da giardíase - uma infecção que causa inchaço nos intestinos.

Adultos e crianças acima de 10 anos apenas

- tratamento da vaginose - uma infecção e inchaço da vagina
- tratar gengivas inchadas e úlceras na boca (gengivite) e outras infecções dentárias
- tratamento de úlceras e úlceras de pressão na perna.

Crianças

Também pode ser usado em crianças para tratar uma infecção bacteriana no estômago (*Helicobacter pylori*).

Recém-nascidos (termo)

Pode ser usado em recém-nascidos a termo para tratar infecções bacterianas e prevenir infecções após uma operação.

2. O que precisa de saber antes de tomar Metronidazol Suspensão

Não tome Metronidazol Suspensão:

- Se tem alergia ao Metronidazol, a outros derivados do imidazol (grupo de medicamentos ao qual o Metronidazol pertence) ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6).

Avisos e Precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Metronidazol Suspensão.

Informe o seu médico se você tem:

- Problemas neurológicos.
- Distúrbios psiquiátricos.
- Doenças sanguíneas.
- História de meningite em uso de Metronidazol.

Informe imediatamente o seu médico se ocorrer uma das seguintes doenças durante o tratamento com Metronidazol :

A partir da primeira dose, existe o risco de ocorrência de reação alérgica grave e súbita (choque anafilático, angioedema), com os seguintes sintomas: aperto no peito, tonturas, náuseas ou desmaios ao ficar em pé (ver secção “Possíveis efeitos colaterais”). Se esses sintomas ocorrerem, pare de usar este medicamento porque sua vida pode estar em risco e entre em contato com seu médico imediatamente.

A ocorrência, no início do tratamento, de vermelhidão espalhando-se por todo o

corpo com pústulas e febre, deve levar a considerar uma reação grave chamada pustulose exantemática generalizada aguda (ver seção “Possíveis efeitos colaterais”); informe o seu médico imediatamente porque isso requer a interrupção do tratamento; esta reação contra-indica qualquer nova administração de Metronidazol isoladamente ou em combinação com outra substância ativa.

A potencial ocorrência ou agravamento de distúrbios nervosos como dificuldade para falar, andar, tremores, movimentos involuntários dos olhos, e outras manifestações com as mãos e pés como sensação de formigamento, sensação de frio, dormência, diminuição da sensibilidade. Esses distúrbios geralmente são reversíveis com a interrupção do tratamento. É então importante interromper o tratamento e consultar imediatamente o seu médico (ver secção “Possíveis efeitos colaterais”). Distúrbios de comportamento de risco para os pacientes podem ocorrer desde as primeiras doses, notadamente em caso de histórico de distúrbios psiquiátricos. É aconselhável interromper o tratamento e consultar um médico (ver secção “Possíveis efeitos colaterais”).

Em caso de histórico de doenças do sangue, de tratamento com altas doses e/ou tratamento prolongado, seu médico pode precisar controlar regularmente sua fórmula de numeração de sangue com exames de sangue.

Informe o médico do laboratório de análise que está a tomar este medicamento se tiver de ser submetido a um teste laboratorial: tomar este medicamento pode interferir com os resultados de alguns testes laboratoriais (teste de Treponema) em caso de resultados falsos positivos (teste de Nelson).

Se você tem síndrome de Cockayne, seu médico também monitorará sua função hepática frequentemente durante e após o tratamento com Metronidazol.

Informe o seu médico imediatamente e pare de tomar Metronidazol se tiver os seguintes sintomas:

- Dores de estômago, anorexia, náuseas, vômitos, febre, desconforto, cansaço, icterícia, urina escura, fezes cor de massa ou comichão.

Crianças

Não aplicável

Outros medicamentos e Metronidazol Suspensão

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente ou se vier a tomar outros medicamentos.

Informe o seu médico especialmente se estiver a tomar:

- Medicamentos que contêm álcool devido a reações do tipo vermelhidão da face, calor, vômitos, aumento da frequência cardíaca.
- Bussulfan (aconselhado no tratamento de certas doenças do sangue e na preparação para enxerto de medula óssea).
- Dissulfiram (usado na prevenção da recaída da dependência de álcool).

Metronidazol Suspensão com alimentos e bebidas

Evite tomar bebidas contendo álcool durante o tratamento de reações do tipo vermelhidão da face, calor, vômitos, aumento da frequência cardíaca.

Gravidez e amamentação

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Se necessário, o Metronidazol pode ser tomado durante a gravidez. Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

É aconselhável não usar Metronidazol se estiver amamentando

Condução e utilização de máquinas

Enquanto estiver a tomar Metronidazol pode sentir tonturas, confusão ou pode ter alucinações, convulsões ou problemas de visão. Se isto acontecer, não conduza nem utilize máquinas ou ferramentas.

A Metronidazol Suspensão contém sacarose

Este medicamento contém sacarose. Se sofre de intolerância à frutose, má absorção de glucose-galactose ou insuficiência de sacarose-isomaltase, não deve tomar este medicamento.

Este medicamento contém 2,5 g de sacarose por 5 ml. Isso deve ser levado em consideração se você tem diabetes.

3. Como tomar Metronidazol Suspensão

Posologia e modo de administração

A duração de um curso dependerá da sua idade e da doença a ser tratada.

A dose habitual é:

- Para adultos: 0,5 g/dia a 1,5 g/dia
- Para crianças: 125 mg/dia a 20-40 mg/kg/dia.

Em alguns casos, o seu parceiro (sexual) também deve ser tratado (com ou sem sinais clínicos de infecção).

EM QUALQUER CASO, CONSULTE A PRESCRIÇÃO DO SEU MÉDICO.

Frequência de administração

2 a 3 vezes ao dia, (de acordo com as indicações específicas)

Duração do tratamento

Tome sempre este medicamento (antibiótico) exatamente como o seu médico lhe disse (nas doses prescritas e durante o tempo que o seu médico lhe disser)

Faça o tratamento completo prescrito pelo seu médico, mesmo que comece a se sentir melhor antes de terminar todos eles. A sensação de fadiga não é causada pela antibioticoterapia, mas sim pela infecção.

Se você parar de tomar o tratamento muito cedo, a infecção pode retornar ou sua condição pode piorar.

Casos particulares:

A duração do tratamento da giardíase é de 5 dias

A duração do tratamento da amebíase é de 7 dias

A duração do tratamento da vaginite é de 7 dias

Vaginitis devido a trichomonas duração do tratamento é de 10 dias

Se tomar mais Metronidazol Suspensão do que deveria

Consulte o seu médico ou farmacêutico imediatamente.

Em caso de vômitos, dificuldades na coordenação dos movimentos, confusão, consulte o seu médico.

Caso se tenha esquecido de tomar Metronidazol Suspensão

Não aplicável.

Se você parar de tomar Metronidazol Suspensão

Não aplicável.

4. Possíveis efeitos colaterais

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos colaterais, embora nem todos os apresentem.

Desordens digestivas

- Distúrbios digestivos: dor de estômago, náuseas, vômitos, diarreia
- Inflamação da língua com sensação de boca seca, inflamação da boca, alteração do paladar e perda de apetite.
- Pancreatite (inflamação do pâncreas), reversível com a descontinuação do tratamento.
- Descoloração ou modificação do aspecto da língua (pode ser causada pelo desenvolvimento de fungos).

Distúrbios da pele e mucosas

- Afrontamentos com vermelhidão da face, comichão, erupção cutânea com por vezes febre.
- Urticária (erupção cutânea semelhante a picadas de urtiga), inchaço súbito da face ou do pescoço de origem alérgica (angioedema), choque alérgico que pode ser fatal (ver seção "O que você precisa saber antes de tomar Metronidazol Suspensão").
- Casos muito raros de vermelhidão espalhando-se por todo o corpo com pústulas e febre (pustulose exantemática generalizada aguda) (ver seção "O que você precisa saber antes de tomar Metronidazol Suspensão").
- Erupção bolhosa com descamação da pele que pode se espalhar para todo o corpo e ser fatal (síndrome de Lyell, síndrome de Stevens-Johnson).
- Eritema pigmentado fixo: erupção cutânea com manchas vermelhas arredondadas com coceira e sensação de queimação deixando manchas coloridas e que podem aparecer nos mesmos locais em caso de nova administração dos medicamentos.

Distúrbios do sistema nervoso

- Danos nos nervos dos membros (neuropatias periféricas sensíveis) resultando em distúrbios das mãos e pés como formigamento, picadas, sensação de frio, sensação de dormência, diminuição da sensibilidade.
- Dor de cabeça.
- Convulsão.

- Confusão.
- Distúrbios neurológicos chamados encefalopatias ou síndrome cerebelar, resultando em estado de confusão, distúrbios de consciência ou de comportamento, dificuldade de coordenação de movimentos, distúrbios de pronúncia, distúrbios de marcha, movimentos involuntários dos olhos, tremores. Esses distúrbios geralmente são reversíveis após a interrupção do tratamento e podem estar associados à modificação da imagem médica (RM). Excepcionalmente, casos de evolução fatal foram relatados (ver seção "O que você precisa saber antes de tomar Metronidazol Suspensão").
- Meningite não microbiana.

Distúrbios psíquicos

- Alucinações.
- Transtornos de personalidade (paranóia, delírio) que podem vir com ideação ou ato suicida (ver seção "O que você precisa saber antes de tomar Metronidazol Suspensão").
- Tendência depressiva

Distúrbios visuais

- Distúrbios visuais transitórios como visão turva, miopia, diminuição da visão, alteração na visão de cores.
- Lesão/inflamação do nervo oftálmico. Distúrbios do sistema sanguíneo
- Níveis anormalmente baixos de glóbulos brancos (neutrófilos) ou plaquetas.

Distúrbios do fígado:

- Aumento das enzimas hepáticas (transaminases, fosfatase alcalina)
- Casos muito raros de doença hepática grave (por vezes com icterícia), nomeadamente casos de deficiência hepática que requerem transplante.

Outros

- Coloração marrom avermelhada da urina causada pelo medicamento.

Relato de efeitos colaterais

Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico ou farmacêutico. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos colaterais não listados neste folheto.

5. Como conservar Metronidazol Suspensão

Armazenar abaixo de 30°C em local seco. Proteger da luz.

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

Agitar bem antes de usar.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

O que contém Metronidazol Suspensão

A substância ativa é Metronidazol 125 mg / 5 ml como Benzoato de Metronidazol.

Cada 5 ml Contém Benzoato de Metronidazol Eq. ao Metronidazol 125 mg.

Sacarose, Sódio Metil parabeno, Sódio Propil Parabeno, Benzoato de Sódio, Glicerina, Sorbitol, Citrato de sódio, Goma xantana, Kyron T-114, Ácido Cítrico Monohidratado, Aerosil (Sílica Anidra Coloidal), Tween 80, Sódio C.M.C., Sacarina Sódio and Sabor.

Metronidazol Suspensão está disponível em frasco de vidro de 100 ml.

Este folheto foi revisto pela última vez em Dezembro de 2022.

MA Holder:



MS Lab
92 rue de Lévis
75017 PARIS FRANCE
www.mslabfrance.com

[Click Here to Know More](#)