

Miconazol 2%

Creme de Nitrato de Miconazol 2% p/p

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informação importante para si.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado apenas para si.

Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode ser-lhes prejudicial, mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença.

- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.

O nome do seu medicamento é Creme de Nitrato de Miconazol 2% p/p (referido como Miconazol 2% Creme neste folheto).

O que têm neste folheto:

1. O que é Miconazol 2% Creme e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Miconazol 2% Creme
3. Como utilizar Miconazol 2% Creme
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como conservar Miconazol 2% Creme
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Miconazol 2% Creme e para que é utilizado

Este medicamento é indicado no tratamento de Tinea pedis (pé de atleta), Tinea cruris (micose na região da virilha), Tinea corporis e onicomicoses (micose nas unhas) causadas pelo Trychophyton, Epidermophyton e Microsporum; candidíase cutânea (micose de pele), Tinea versicolor e cromofitose.

Este medicamento é utilizado para tratamento de diversas micoses superficiais. Geralmente, age rapidamente no prurido (coceira), sintoma que frequentemente acompanha as infeções por fungos e também age no odor desagradável provocado pelas micoses superficiais.

2. O que precisa de saber antes de tomar Miconazol 2% Creme

O produto não deve ser usado por pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Este medicamento não deve ser utilizado na região dos olhos.

Gerais

Se ocorrer alguma reação sugerindo hipersensibilidade ou irritação, o tratamento deve ser interrompido.

Este medicamento é destinado ao uso externo, devendo ser utilizado com cuidado nas regiões periorbitais, evitando seu contato com os olhos. Medidas de higiene devem ser adotadas para controlar fontes de infecção ou reinfecção.

Gravidez e amamentação

Não existem relatos de problemas específicos relacionados a mulheres grávidas ou lactantes.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.

Pediatria

Não foram relatados, até o momento, problemas específicos do uso de Nitrato de Miconazol por crianças.

Idosos

Não há relatos de problemas específicos relacionados à idade.

Interações medicamentosas

ão são conhecidas interações do Nitrato de Miconazol com outras substâncias, quando usados concomitantemente.

O uso do Nitrato de Miconazol pode causar aumento na atividade anticoagulante em pacientes que fazem uso de anticoagulantes cumarínicos.

Interferência em exames laboratoriais

Como o Nitrato de Miconazol é muito pouco absorvido, este não interfere em exames laboratoriais.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro

medicamento.

3. Como utilizar Miconazol 2% Creme

A aplicação do produto deve ser feita após lavagem e secagem do local. Aplique a quantidade recomendada diretamente sobre a região atingida. Ao aplicar o medicamento, espalhe-o por uma região um pouco maior do que a afetada. Se a área atingida não for as mãos, lave-as cuidadosamente após a aplicação. É recomendável a troca frequente das roupas que ficam em contato com a área infectada, a fim de evitar a reinfecção. Este medicamento não mancha a pele e nem a roupa.

Creme dermatológico

Em dermatites e em infecções por *Candida*, aplicar quantidade suficiente do produto para cobrir a área afetada, duas vezes ao dia (pela manhã e à noite).

O tratamento deve ser ininterrupto e mantido até o completo desaparecimento das lesões, o que ocorre geralmente após 2 a 5 semanas, dependendo da sua extensão. Após o desaparecimento dos sinais e sintomas, o tratamento deve ser mantido por mais uma semana, a fim de evitar recidivas.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure a orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure a orientação do seu médico ou cirurgião-dentista.

O que devo fazer quando eu me esquecer de usar este medicamento

Caso esqueça-se de aplicar o medicamento, aplique-o assim que lembrar. Se estiver próximo do horário da outra aplicação, pule a dose esquecida e volte a aplicar no horário habitual. Não use o dobro de dosagem para compensar doses esquecidas.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

4. Possíveis efeitos colaterais

Este medicamento é geralmente bem tolerado. Existem relatos isolados de irritação ou de sensação de queimação associados à utilização de Miconazol.

Em tais casos, geralmente é suficiente interromper algumas aplicações. Ardor e

vermelhidão no local da aplicação podem indicar uma sensibilidade exacerbada (alergia). Neste caso, você deve interromper o tratamento e consultar seu médico.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

O uso excessivo pode ocasionar irritação da pele, que desaparece com a descontinuação do tratamento. Em caso de ingestão acidental pode ser utilizado um método de esvaziamento gástrico, a critério médico.

5. Como conservar Miconazol 2% Creme

Conservar a temperatura inferior a 25°C. Não congelar.

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

Manter o bispnaga bem fechado após o uso.

Somente para uso externo.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Miconazol 2% Creme

- A substância ativa é Nitrato de Miconazol.
- Cada grama contém 20 mg de Nitrato de Miconazol (2% p/p).
- Os outros ingredientes são: Álcool cetosteárico, cetomacrogol 1000, vaselina branca, parafina líquida leve, hidroxitolueno butilado, metil parabeno, hidróxido de sódio, paracloro metacresol, EDTA dissódico, propilenoglicol e óleo de sílicio.

Miconazol 2% Creme está disponível em um bispnaga de 15 g.

Este folheto foi revisto pela última vez em Dezembro de 2022.

MA Holder:



MS Lab
92 rue de Lévis
75017 PARIS FRANCE
www.ms-labfrance.com

[Click Here to Know More](#)