

Neomicina + Bacitracina

Sulfato de Neomicina e Bacitracina Pomada

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento pois contém informação importante para si.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença.
- Se tiver quaisquer efeitos colaterais, incluindo possíveis efeitos colaterais não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Ver secção 4.

O nome do seu medicamento é Sulfato de Neomicina e Bacitracina Pomada (referido como Neomicina + Bacitracina Pomada neste folheto).

O que têm neste folheto:

1. O que são Neomicina + Bacitracina Pomada e para que são utilizados
2. O que precisa de saber antes de utilizar Neomicina + Bacitracina Pomada
3. Como utilizar Neomicina + Bacitracina Pomada
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como conservar Neomicina + Bacitracina Pomada
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que são Neomicina + Bacitracina Pomada são para que é utilizados

Neomicina + Bacitracina Pomada é um medicamento antibacteriano de largo espectro de aplicação tópica. Está indicado na prevenção ou tratamento de infeções superficiais da pele, tais como, impetigo, úlceras tróficas e varicosas, queimaduras pouco extensas, cortes, arranhões (escoriações) e infeções superficiais da pele após intervenção cirúrgica.

2. O que precisa de saber antes de utilizar Neomicina + Bacitracina Pomada

Não utilize Neomicina + Bacitracina Pomada:

- Se tem alergia (hipersensibilidade) ao Sulfato de Neomicina, à Bacitracina ou a qualquer outro componente de Neomicina + Bacitracina Pomada.
- Se tem história de alergia a substâncias tais como frameticina, canamicina, gentamicina e outros antibióticos relacionados.

Existe a possibilidade de absorção aumentada em crianças muito jovens, pelo que a utilização de Neomicina + Bacitracina Pomada não é recomendada em recém-nascidos e lactentes (crianças até aos 2 anos). Neomicina + Bacitracina Pomada não deve ser aplicado nos olhos.

Advertências e precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar Neomicina + Bacitracina Pomada. Não se deve exceder a posologia recomendada.

Tal como acontece com outros aminoglicosídeos, após absorção significativa para a corrente sanguínea, a neomicina pode ser irreversivelmente tóxica para o ouvido; o sulfato de Neomicina e a Bacitracina são substâncias potencialmente tóxicas para o

rim, pelo que não é recomendada a utilização de Neomicina + Bacitracina Pomada em quantidades elevadas ou em áreas extensas durante longos períodos de tempo, circunstâncias nas quais pode ocorrer absorção sistémica significativa.

Nos casos de insuficiência renal, a depuração plasmática da neomicina é reduzida, o que implica um maior risco de ototoxicidade; assim, a dose deverá ser reduzida em função do grau de insuficiência renal (ver secção 3 "Como utilizar Neomicina + Bacitracina Pomada").

Após conclusão do tratamento com Neomicina + Bacitracina Pomada, este não deverá ser repetido, pelo menos, durante os próximos três meses. Tal como acontece com outros medicamentos antibacterianos, o uso prolongado de Neomicina + Bacitracina Pomada poderá causar o desenvolvimento de organismos não susceptíveis, incluindo fungos.

Não é recomendada a utilização concomitante de Neomicina + Bacitracina Pomada com outros aminoglicosídeos.

Outros medicamentos e Neomicina + Bacitracina Pomada

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a utilizar, ou tiver utilizado recentemente, ou se vier a utilizar outros medicamentos.

Após absorção significativa para a corrente sanguínea, o sulfato de neomicina pode intensificar e prolongar o efeito depressor respiratório dos agentes bloqueadores neuromusculares.

Gravidez e amamentação

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este medicamento.

Não existem dados suficientes e adequados relativos à utilização de Neomicina + Bacitracina Pomada durante a gravidez ou aleitamento, pelo que o seu uso apenas deve ser considerado se os potenciais benefícios para a mãe justificarem os potenciais riscos para o feto ou lactente.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Não são conhecidos quaisquer efeitos sobre a capacidade de condução de veículos e utilização de máquinas.

3. Como utilizar Neomicina + Bacitracina Pomada

Utilize este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Limpe suavemente a área da pele afetada antes de aplicar Neomicina + Bacitracina Pomada.

Adultos e Crianças (idade igual ou superior a 2 anos)

Aplique uma camada fina de pomada 1 a 4 vezes por dia, dependendo da sua situação clínica.

O tratamento não deverá ser prolongado por mais do que sete dias sem acompanhamento médico.

Não aplique Neomicina + Bacitracina Pomada

em recém-nascidos e lactentes (crianças de idade inferior a 2 anos).

Idosos

Neomicina + Bacitracina Pomada pode ser utilizado nos idosos. Recomenda-se precaução nos casos em que existe diminuição da função renal e em que pode ocorrer absorção sistémica significativa de Sulfato de Neomicina.

Insuficiência renal

A dosagem deverá ser reduzida em doentes com insuficiência renal.

Se utilizar mais Neomicina + Bacitracina Pomada do que deveria

Não têm sido associados sintomas ou sinais ao uso excessivo de Bacitracina + Neomicina (pomada), no entanto deve-se considerar uma absorção significativa para a corrente sanguínea.

Em caso de sobredosagem deverá ser interrompido o tratamento com Neomicina + Bacitracina Pomada e implementar-se as medidas de tratamento adequadas.

Caso se tenha esquecido de utilizar Neomicina + Bacitracina Pomada

Caso se esqueça de aplicar a pomada na altura recomendada, proceda à sua aplicação logo que possível. Se estiver próximo da aplicação seguinte, aguarde e aplique na altura recomendada.

Se parar de utilizar Neomicina + Bacitracina Pomada

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Possíveis efeitos colaterais

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos colaterais, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Quando utilizado nas quantidades recomendadas e pelo período de tempo estabelecido, não foram reportados efeitos secundários associados ao tratamento com Neomicina + Bacitracina Pomada.

A incidência de hipersensibilidade (alergia) à Neomicina, na população em geral, é baixa. No entanto, esta incidência é maior em grupos selecionados de doentes dermatológicos, particularmente em doentes com eczema de estase venosa e ulceração.

A reação alérgica a Neomicina após aplicação tópica podera manifestar-se como vermelhidão e descamação de pele infetada, agravamento eczematoso da lesão ou ausência de cicatrização.

Raramente foram relatados casos de alergia e reação anafilática aplicação tópica de Bacitracina.

Se algum dos efeitos colaterais se agravar ou se detetar quaisquer efeitos colaterais mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

5. Como conservar Neomicina + Bacitracina Pomada

Conservar a temperatura inferior a 25°C. Não congelar.

Manter fora da vista e do alcance das crianças.

Medicamento sujeito a receita médica.

Manter o bisnaga bem fechado após o uso.

Somente para uso externo.

Não utilize Neomicina + Bacitracina Pomada após o prazo de validade impresso na embalagem exterior, "EXP". O prazo de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Neomicina + Bacitracina Pomada

- As substâncias ativas são Sulfato de Neomicina e Bacitracina.
- Cada grama contém 3,300 UI de Sulfato de Neomicina e 250 UI de Bacitracina.
- Os outros componentes são: PEG 400, PEG 4000, Propileno Glicol, Hidroxi Tolueno Butilado (BHT).

Neomicina + Bacitracina Pomada esta disponível em bisnaga de 15 g.

Este folheto foi revisado pela última vez em Dezembro de 2022.

MA Holder:



MS Lab
92 rue de Lévis
75017 PARIS FRANCE
www.mslabfrance.com

[Click Here to Know More](#)