

Prometazina

Solução Oral de Prometazina 5 mg/5 ml

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informação importante para si.

- Guarde este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não o passe para os outros. Pode prejudicá-los, mesmo que seus sinais de doença sejam os mesmos que os seus.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico ou farmacêutico. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos colaterais não listados neste folheto.

O nome do seu medicamento é Solução oral de Prometazina 5 mg/5 ml (referido como Prometazina Solução neste folheto).

O que tem neste folheto

1. O que é Prometazina Solução e para que é utilizado
2. O que precisa saber antes de tomar Prometazina Solução
3. Como tomar Prometazina Solução
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como conservar Prometazina Solução
6. Conteúdo da embalagem e outras informações.

1. O que é Prometazina Solução e para que é utilizado

Como tratamento sintomático para condições alérgicas do trato respiratório superior e da pele, incluindo rinite alérgica, urticária e reações anafiláticas a drogas e proteínas estranhas.

- Como antiemético.
- Para uso a curto prazo.
- Tratamento da insônia em adultos.
- Para uso a curto prazo como sedativo pediátrico.
- Tratamento e prevenção de enjoo de movimento.

2. O que precisa saber antes de tomar Prometazina Solução

Não tome Prometazina Solução:

Prometazina solução não deve ser usado em pacientes em coma ou que sofram de depressão do SNC de qualquer causa. Prometazina solução não deve ser administrado a pacientes com hipersensibilidade conhecida à Prometazina ou a qualquer um dos excipientes. A Prometazina é contraindicada para uso em crianças com menos de dois anos de idade devido ao potencial de depressão respiratória fatal. Prometazina solução deve ser evitado em pacientes em uso de inibidores da monoaminoxidase até 14 dias antes.

Prometazina solução deve ser evitado em pacientes em uso de inibidores da monoaminoxidase até 14 dias antes.

Avisos e Precauções :

Prometazina solução pode engrossar ou

secar as secreções pulmonares e prejudicar a expectoração. Portanto, deve ser usado com cautela em pacientes com asma, bronquite ou bronquiectasia.

Use com cuidado em pacientes com doença arterial coronariana grave, glaucoma de ângulo estreito, epilepsia ou insuficiência hepática e renal.

Deve-se ter cautela em pacientes com colo vesical ou obstrução piloroduodenal.

O uso de Prometazina deve ser evitado em crianças e adolescentes com sinais e sintomas sugestivos de Síndrome de Reye. A Prometazina pode mascarar os sinais de alerta de ototoxicidade causados por drogas ototóxicas, por exemplo, salicilatos. Também pode retardar o diagnóstico precoce de obstrução intestinal ou aumento da pressão intracraniana através da supressão do vômito. Prometazina Solução não deve ser usado por mais de 7 dias sem consultar um médico.

Outros medicamentos e Prometazina Solução:

Prometazina Solução aumentará a ação de qualquer agente anticolinérgico, antidepressivo tricíclico, sedativo ou hipnótico. O álcool deve ser evitado durante o tratamento. Prometazina Solução pode interferir nos testes imunológicos de gravidez de urina para produzir resultados falso-positivos ou falso-negativos. Prometazina solução deve ser descontinuado pelo menos 72 horas antes do início dos testes cutâneos, pois pode inibir a resposta cutânea da histamina, produzindo resultados falso-negativos.

3. Como tomar Prometazina Solução

Via de administração: Oral.

Não deve ser usado em crianças menores de 2 anos

Como anti-histamínico na alergia :

Crianças de 2 a 5 anos	De 5 a 15 mg em dose única. Ou 5 mg duas vezes Dose máxima diária 15 mg.
Crianças de 5 a 10 anos	De 10 a 25 mg em dose única. Ou 5 - 10 mg duas vezes Dose máxima diária 25 mg.
Crianças com mais de 10 anos e adultos (incluindo idosos)	Inicialmente 10mg duas vezes. Aumentar até um máximo de 20 mg três vezes conforme necessário.

Como antiemético :

Crianças de 2 a 5 anos	5 mg a tomar na noite anterior à viagem. Para ser repetido após 6 - 8 horas, conforme necessário.
Crianças de 5 a 10 anos	10 mg a tomar na noite anterior à viagem. Para ser repetido após 6 - 8 horas, conforme necessário.
Crianças com mais de 10 anos e adultos (incluindo idosos)	25 mg a tomar na noite anterior à viagem. Para ser repetido após 6-8 horas, conforme necessário.

Como sedativo pediátrico para uso a curto prazo e para tratamento a curto prazo da insônia em adultos :

Crianças de 2 a 5 anos	15 ou 20 mg em dose única noturna.
Crianças de 5 a 10 anos	20 ou 25 mg em dose única noturna.
Crianças com mais de 10 anos e adultos (incluindo idosos)	25 ou 50 mg em dose única noturna.

Se você tomar mais Prometazina Solução do que deveria :

Os sintomas de sobredosagem grave são variáveis. Eles são caracterizados em crianças por várias combinações de excitação, ataxia, incoordenação, atetose e alucinações, enquanto os adultos podem ficar sonolentos e entrar em coma. As convulsões podem ocorrer tanto em adultos quanto em crianças: coma ou excitação podem preceder sua ocorrência. Pode ocorrer taquicardia. A depressão cardiorrespiratória é incomum. Se o paciente for atendido logo após a ingestão, deve ser possível induzir o vômito com ipecacuanha apesar do efeito antiemético da Prometazina; alternativamente, a lavagem gástrica pode ser usada. O tratamento é de suporte, com atenção à manutenção do estado respiratório e circulatório adequado. As convulsões devem ser tratadas com diazepam ou outro anticonvulsivante adequado.

Se você esquecer de tomar Prometazina Solução:

Não tome uma dose dupla para compensar uma esquecida. Em vez disso, você deve simplesmente continuar com a próxima dose quando for devido. Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Possíveis efeitos colaterais

Os efeitos colaterais podem ser observados em alguns pacientes: sonolência, tontura, inquietação, dores de cabeça, pesadelos, cansaço e desorientação. Efeitos colaterais anticolinérgicos como visão turva, boca seca e retenção urinária ocorrem ocasionalmente. Os bebês são suscetíveis aos efeitos anticolinérgicos da Prometazina, enquanto outras crianças podem apresentar hiperexcitabilidade paradoxal. Os idosos são particularmente suscetíveis aos efeitos anticolinérgicos e confusão devido à Prometazina. Outros efeitos colaterais incluem urticária, erupção cutânea, prurido, anorexia, irritação gástrica, palpitações, hipotensão, arritmias, efeitos extrapiramidais, síndrome das pernas inquietas, espasmos musculares e movimentos semelhantes a tiques da cabeça e da face. Anafilaxia, icterícia e discrasias sanguíneas, incluindo anemia hemolítica, raramente ocorrem. Reações cutâneas fotossensíveis foram relatadas. A luz solar forte deve ser evitada durante o tratamento.

5. Como conservar Prometazina Solução

Não armazene acima de 30°C. Proteger da luz. Conservar na embalagem original. Manter fora da vista e do alcance das crianças. Agitar bem antes de usar. Não use após o prazo de validade (mês, ano) no rótulo e na embalagem. A data de validade refere-se ao último dia

desse mês.

Se estiver caducado ou já não o quiser, devolva-o à farmácia.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações.

Qual a composição de Prometazina Solução

A substância ativa é a Cloridrato de Prometazina.

Cada 5 ml de oral solução contém 5 mg de Cloridrato de Prometazina.

Os outros componentes são: Metilparabeno De Sódio, Propilparabeno de Sódio, Benzoato de Sódio, Sacarose, Glicose Líquida, Propileno Glicol, Sorbitol, Sacarina Sódio, Mentol, Monohidratado de Ácido Cítrico, Citrato de Sódio, Sabor.

Solução oral de Prometazina está disponível em frasco de vidro de 100 ml.

Este folheto foi revisto pela última vez em Dezembro de 2022.

MA Holder:



MS Lab
92 rue de Lévis
75017 PARIS FRANCE
www.mslabfrance.com

[Click Here to Know More](#)