

Xtacid Comprimidos

Comprimidos de Carbonato de Cálcio e Carbonato de Magnésio

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento pois contém informação importante para si.

Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica.

Utilize sempre este medicamento exatamente como descrito neste folheto ou conforme indicado pelo seu médico ou farmacêutico.

- Guarde este folheto. Pode ter necessidade de relê-lo.
- Se necessitar de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas após 7 dias, consulte o seu médico.
- Se sentir quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Consulte a secção 4.

O que tem neste folheto:

1. O que é Xtacid Comprimidos e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Xtacid Comprimidos
3. Como tomar Xtacid Comprimidos
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como conservar Xtacid Comprimidos
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Xtacid Comprimidos e para que é utilizado

Xtacid Comprimidos é indicado para o tratamento sintomático de úlceras gástricas ou duodenais, excesso de ácido estomacal e azia.

Xtacid Comprimidos contém dois antiácidos - Carbonato de Cálcio e Carbonato de Magnésio, que têm um efeito rápido e de longo prazo de neutralizar o excesso de ácido estomacal.

2. O que você precisa saber antes de tomar Xtacid Comprimidos

Não use Xtacid comprimidos mastigáveis:

- se tem uma doença renal grave ou se tem cálculos renais;
- se tem níveis elevados de cálcio ou níveis baixos de fosfatos no sangue;
- se tem alergia ao carbonato de cálcio, carbonato de magnésio ou a qualquer outro componente deste medicamento (indicados na secção 6).

Avisos e Precauções

Tal como acontece com outros antiácidos, tomar estes comprimidos pode ocultar os sintomas de outras doenças mais graves.

Fale com o seu médico se não se sentir melhor ou se se sentir pior após 7 dias. Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de começar a tomar Xtacid comprimidos se tiver problemas renais.

O uso prolongado da droga deve ser evitado. Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente ou se vier a tomar outros medicamentos.

- Se estiver tomando antibióticos (tetraciclina, quinolonas), glicosídeos cardíacos (digoxina), bisfosfonatos (medicamentos que afetam a densidade óssea), dolutegravir (um medicamento antiviral), levotiroxina (hormônio da tireoide), eltrombopag (medicamento que aumenta a contagem de plaquetas) ou outra prescrição medicamentos (por exemplo, fluoretos, fosfatos, preparações contendo ferro), fale com o seu médico antes de tomar Xtacid Comprimidos, uma vez que Xtacid Comprimidos pode afetar estes medicamentos.
- Se tomar diuréticos tiazídicos que são utilizados para aumentar a produção de urina, informe previamente o seu médico sobre a toma dos comprimidos de Xtacid, uma vez que o médico pode querer monitorizar os níveis de cálcio no seu sangue.

Para maximizar os benefícios de todos os medicamentos, tome Xtacid comprimidos 1 a 2 horas após tomar qualquer outro medicamento.

Xtacid Comprimido com alimentos e bebidas

Como outros antiácidos contendo cálcio, deve-se evitar tomar este medicamento com grandes quantidades de leite ou laticínios.

Gravidez, amamentação e fertilidade

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar o medicamento se estiver grávida, a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar.

Xtacid comprimidos para mastigar pode ser usado nas doses recomendadas durante a gravidez e amamentação, mas a dose diária máxima não deve ser excedida. Não utilize durante mais de 2 semanas (ver secção 3, "Como utilizar Xtacid comprimidos para mastigar"). As mulheres grávidas devem evitar tomar muito leite e laticínios ao

mesmo tempo para evitar que o cálcio se acumule no corpo.

De acordo com os dados disponíveis, Xtacid Comprimidos não prejudica a fertilidade humana.

Condução e operação de máquinas

Xtacid Comprimidos não tem efeito sobre a habilidade de dirigir ou operar máquinas.

Xtacid Comprimidos contém sacarose

Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, fale com o seu médico antes de tomar este medicamento.

3. Como tomar Xtacid Comprimidos

Utilize sempre este medicamento exatamente como descrito neste folheto ou conforme indicado pelo seu médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Adultos e crianças com idade superior a 12 anos:

1–2 comprimidos mastigáveis em dose única, de preferência uma hora após uma refeição e antes de deitar, bem como em caso de dor durante a azia. Não tome mais de 11 comprimidos em 24 horas.

Se as queixas persistirem após 7 dias, converse com seu médico para descartar a presença de uma doença mais grave. Não use por mais de 2 semanas (ao tomar o medicamento continuamente).

O medicamento não deve ser administrado a crianças com idade inferior a 12 anos.

Se tomar mais Xtacid Comprimidos do que deveria

Não tome mais comprimidos, beba muita água e consulte o seu médico ou farmacêutico. Os sintomas de sobredosagem incluem náuseas e vômitos, obstipação, fadiga, aumento da produção de urina, sede, desidratação e fraqueza muscular anormal.

Caso se tenha esquecido de tomar Xtacid Comprimidos para mastigar

Não tome uma dose dupla se você esqueceu a dose anterior.

Se ainda tiver dúvidas sobre a utilização deste produto, fale com o seu médico ou farmacêutico.

4. Possíveis efeitos colaterais

Como todos os medicamentos, Xtacid Comprimidos pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

Se sentir algum destes efeitos secundários pare de tomar o medicamento e consulte o seu médico imediatamente. Pode ocorrer muito raramente (menos de 1 em cada 10.000 pessoas) uma reação alérgica aos componentes do medicamento. Os sintomas podem incluir erupção na pele, comichão,

dificuldade em respirar, tonturas ou inchaço da face, lábios, língua ou garganta.

A administração prolongada de grandes doses pode aumentar os níveis de cálcio e magnésio no sangue, especialmente em pacientes com doença renal.

A administração prolongada de Xtacid comprimidos com leite ou produtos lácteos pode resultar na síndrome do leite alcalino, que causa níveis elevados de cálcio no sangue. Os sintomas da síndrome do leite alcalino incluem alteração do paladar, dor de cabeça, problemas renais e fadiga.

Relatório de efeitos colaterais

Ao comunicar efeitos secundários, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

5. Como conservar Xtacid Comprimidos

Armazenar abaixo de 30°C. Proteger da luz e da umidade.

Manter fora da vista e da alcance das crianças.

Não use Xtacid Comprimidos após o prazo de validade.

Data de validade impressa na embalagem externa após “EXP”. a data de validade corresponde ao último dia do mês indicado.

Os medicamentos não devem ser descartados no ralo ou no lixo doméstico.

Pergunte ao seu farmacêutico como se livrar dos medicamentos que você já possui. Não é necessário. Estas medidas irão ajudar a proteger o meio ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Xtacid Comprimidos

- As substâncias ativas são carbonato de cálcio e carbonato de magnésio.

Cada comprimido para mastigar não revestido contém 680 mg de Carbonato de Cálcio e 80 mg de Carbonato de Magnésio.

- Os outros excipientes são sacarose, talco, amido de milho pré-gelatinizado, amido de batata, estearato de magnésio, parafina líquida, Hortelã Sabor.

Xtacid Comprimidos está disponível em caixinha de 5 x 12 Comprimidos.

Este folheto foi revisto pela última vez em Dezembro de 2022.

MA Holder:



MS Lab
92 rue de Lévis
75017 PARIS FRANCE
www.ms-labfrance.com

[Click Here to Know More](#)